



**التمرين الثاني:**

**الجزء الأول:** تتمثل مظاهر النمو عند الكائنات الحية في زيادة وزنها وطولها وينتج ذلك عن ظواهر حيوية تحدث في بعض الأنسجة المتخصصة سنتناول في هذا الموضوع بعض هذه المظاهر عند النبات.


تمثل الوثيقة -1- نسيج المرستيم الابتدائي في القمة النامية لجذر البصل أثناء قيامها بظاهرة حيوية هامة

1- سمي الظاهرة الحيوية التي تظهرها الوثيقة -1-؟





2- تعرّف على المراحل المشار إليها بالأرقام، ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني

المرحلة	ترتيبها حسب تسلسلها الزمني	الرقم
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8

3- ما هي النتيجة النهائية للظاهرة المدروسة



الجزء الثاني: أكمل الجدول التالي مظهرا شكل وموقع الصبغيات في كل مرحلة من مراحل الممثلة

أذكر مميزات كل مرحلة ( التركيز على سلوك الصبغيات فقط )	تمثيل المراحل برسومات تخطيطية باخذ $2n=6$	مراحل ظاهرة حيوية
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

نريد التعرف على اليات النمو في النبات، ننجز التجارب الآتية للوصول الى ذلك:  
أولاً: تمثل الوثيقة (1) رسومات لتنامي بذرة الفاصولياء خلال مراحل مختلفة من حياته.  
1- صف التغيرات الملاحظة؟


مع مرور الزمن نلاحظ اثناء إنتاش بذرة الفاصولياء يزداد طول الجذر والساق، أي نمو المجموع لبخضري والجذري للنبات (0.5 ن)

2- كيف تسمى الظاهرة التي حدثت؟ ضع تعريفا علميا لها؟

تسمية الظاهرة: هي النمو (0.75 ن)

تعريف النمو: النمو هي ظاهرة حيوية تتمثل في تغيرات كمية في زيادة الطول والوزن للكائن الحي وتكون بشكل غير عكوس (1 ن)

ثانياً: 1- في نفس المعلم، حول معطيات الجدول إلى منحنيات بيانية (على الورقة الميليمترية). (2 ن)



2- قدم تحليلاً مقارناً للمنحنيات التي تم تمثيلها

يمثل التمثيل البياني تغيرات الوزن الجاف لكل من الفلقتين والرشيم بدلالة الزمن بالأيام (0.5 ن) حيث نلاحظ:  
في البداية (اليوم الأول) يكون الوزن الجاف للفلقتين كبير (0.25)، ثم يتناقص تدريجياً (0.25 ن) حتى ينعدم في اليوم 13 (0.25 ن)،

بينما يكون في البداية (اليوم الأول) وزن الجاف للرشيم منخفض (0.25 ن) ثم يتزايد تدريجياً ليصل إلى 37 غ في اليوم 13 (0.25 ن)

ومنه: إن تناقص الوزن الجاف للفلقتين وتزايدها في الرشيم يدل على استهلاك الرشيم لمدخرات الفلقتين (0.5 ن)

### مجموع التحليل المقارن : 2.25

بذلك نستنتج: ان مصدر المواد العضوية والأملاح المعدنية للرشيم في مرحلة الإنتاش (اثناء الإنتاش) هي المدخرات الموجودة في الفلقتين (أعضاء الإدخار) (0.5 ن)

المجموع النقاط الصفحة الأولى ( التمرين الأول ) : (7 ن)

1- سمي الظاهرة الحيوية التي تظهرها الوثيقة -1-؟

**الظاهرة الحيوية: هي ظاهرة التضاعف الخلوي - إنقسام خيطي المتساوي ( 0.5 ن )**

2- تعرّف على المراحل المشار إليها بالأرقام، ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني

الرقم	المرحلة	ترتيبها حسب تسلسلها الزمني
1	تمهيدية للإنقسام الخيطي المتساوي ( الميتوزي )	7
2	إنفصالية للإنقسام الخيطي المتساوي ( الميتوزي )	4
3	إستوائية للإنقسام الخيطي المتساوي ( الميتوزي )	5
4	( نهاية ) البينية	1
5	بداية التمهيدية للإنقسام الخيطي المتساوي ( الميتوزي )	3
6	بداية النهائية للإنقسام الخيطي المتساوي ( الميتوزي )	2
7	البينية	6
8	نهاية النهائية للإنقسام الخيطي المتساوي ( الميتوزي ) بتشكيل خليتين بنتين	8

**تنقيط الجدول : ( 0.25 ن لكل مرحلة ) = 2 ن الترتيب = 1 ن**


3- ما هي النتيجة النهائية للظاهرة المدروسة

**النتيجة النهائية هي: الحصول على خليتين بنتين متماثلتين مع الخلية الأم في الصيغة الصبغية ( 0.5 ن )**

**و تحتويان على نصف المحتوى الهيلولي للخلية الأم ( 0.5 ن ) ،**

**إحدى الخليتين تدخل مرحلة بينية لتتقسم مرة أخرى (من جديد وتبقى في النسيج المرستمي)، أما الخلية الأخرى**







**فتتطاول و يتزايد أبعادها في منطقة الإستطالة ثم تنمايز ( 0.5 ن )**



**مجموع النقاط الصفحة الثانية (الجزء الأول للتمرين الثاني): ( 5 ن )**



**الجزء الثاني:** أكمل الجدول التالي مظهرًا شكل وموقع الصبغيات في كل مرحلة من مراحل الممثلة

أذكر مميزات كل مرحلة ( التركيز على سلوك الصبغيات فقط )	تمثيل المراحل برسومات تخطيطية باخذ $2n=6$	مراحل ظاهرة حيوية
<p>- تحلزن وتكاثف الخيوط الصبغية الكروماتينية حيث يقل طولها و يزداد سمكها لتشكل صبغيات. ( <math>0.5n</math> )</p> <p>- يظهر كل صبغي يتكون من كروماتيدتين متصلين بالجزء المركزي ( <math>0.5n</math> )</p> <p>- تكون الصبغيات متبعثرة في الهيولى ( <math>0.5n</math> )</p>		
<p>- تبلغ الصبغيات أقصى درجة من الإلتفاف التحلزن ويكون الصبغي مكون من كروماتيدتين متصلين بجزء مركزي حيث يكون في أوضح صورة ( <math>0.5n</math> )</p> <p>- تتوضع الصبغيات على اللوحة الإستوائية ( <math>0.5n</math> )</p>		
<p>- تضاعف الجزء المركزي لكل صبغي فتنفصل الكروماتيدتي الصبغي الواحد عن بعضهما البعض، و تهاجر كل كروماتيدة عن قرينتها إلى الأقطاب الخلية المعاكسة ( <math>0.5n</math> )</p> <p>- يتكون الصبغي من كروماتيدة واحدة ( <math>0.5n</math> )</p>		
<p>- يزول التحلزن و تكاثف الصبغيات لتتحول إلى خيوط كروماتينية من جديد ( <math>0.5n</math> )</p>	