

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الأغواط

ثانوية الشَّيْخ أحمد قصبية

الاختبار الأول في مادة الرياضيات لسنوات الثالثة رياضيات

2018/12/03

11:00

إلى



8:00

من

ملاحظة

☞ يحتوي الموضوع على سؤال نظري و أربعة تمارين.

☞ كل التمارين إجبارية .

☞ تُمنح نُقْطَةٌ واحدةٌ عَلَى تَنْظِيمِ وَرَقَةِ الإِجَابَةِ.

السؤال النظري: (نقطة واحدة)

علما أن الدالة "ln" مستمرة وقابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$.

أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

التمرين الأول: (03 نقاط):

نعتبر في \mathbb{Z}^2 المعادلة: $(E): x^2 - 5y^2 = 3$.

(1 - أ) أثبت أنه إذا كان $(x; y)$ حلاً للمعادلة (E) فإن: $x^2 \equiv 3 [5]$.

(1 - ب) عين البواقي الممكنة لقسمة x^2 على 5.

(1 - ج) استنتج أن المعادلة (E) لا تقبل حلولاً في \mathbb{Z}^2 .

(2 - حل في \mathbb{Z} الموافقة: $x^2 + 3x + 1 \equiv 0 [5]$.

التمرين الثاني: (03 نقاط):

أجب بـ: صحيح أو خطأ مع التبرير.

1- من أجل كل x من \mathbb{R}_+^* , و من أجل كل n من \mathbb{Q} , $\ln(\ln((x)^{(2)^{-n}})) = -n \ln 2 + \ln(\ln(x))$.

2- من أجل كل x من $]-1; 0[$, $e^{|\ln(x)|} = \frac{1}{x}$.

3- لدينا: n عدد طبيعي غير معدوم و x عدد حقيقي من $]0; \frac{\pi}{2}[$.

إذا كان: $\begin{cases} \log(\sin x) + \log(\cos x) = -1 \\ \log(\sin x + \cos x) = \frac{1}{2}(-1 + \log n) \end{cases}$ فإن: $n = 12$.

التمرين الثالث: (06 نقاط):

في الشكل المقابل، C_f هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بالعلاقة $f(x) = \frac{4x}{1+x}$ ولدينا $\Delta: y = x$.

I- تحقق أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]0; 3[$.

II- لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بمجدها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n , $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n}$.

(1) أعد رسم الشكل ثم مثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل دون حسابها، مبرزاً خطوط الإنشاء.


(2) ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها.

(3) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 < u_n < 3$.

(4) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

III- المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} كما يلي: $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n}$.

(1 - أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.



(1 - ب) أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n = \frac{3}{1+2\left(\frac{1}{4}\right)^n}$.

(2) عين قيمة العدد الطبيعي n بحيث: $v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = -\frac{341}{128}$.

(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = \frac{3}{u_0} + \frac{3}{u_1} + \frac{3}{u_2} + \dots + \frac{3}{u_n}$.

(3 - أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $S_n = \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) + n + 1$.

(3 - ب) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{S_n}{n}\right)$.

(3 - ج) أدرس إتجاه تغير المتتالية (S_n) .

التمرين الرابع (06 نقاط):

الجزء الأول:

g الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} كما يلي: $g(x) = e^x(2-x) - 2$. C_g تمثيلها في معلم متعامد ومتجانس.

(1) أحسب: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1.5 < \alpha < 1.6$.

(4) أحسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة الدالة g على \mathbb{R} .

(5) بين أن معادلة المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة α تكتب على الشكل: $y = \frac{2(1-\alpha)}{(2-\alpha)}(x-\alpha)$.

(6) لتكن الدالة العددية h المعرفة على $]0, +\infty[$ كما يلي: $h(x) = |g(x)|$.

- بين أن الدالة h غير قابلة للاشتقاق عند $x_0 = a$.

الجزء الثاني:

f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} كما يلي: $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{e^x - 1}; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

(1) بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} . ثم برّر أنها مستمرة على \mathbb{R} .

(2) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(3) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} , $f'(x) = \frac{xg(x)}{(e^x - 1)^2}$.

(4) أدرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(5) بين أن: $f(a) = a(2-a)$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(a)$.

(6) أنشئ C_f منحنى الدالة f في معلم متعامد ومتجانس.

(7) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = e^{-m}$.

الأستاذ: زيدة يتمنى النجاح للجميع