

امتحان الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

ع دالة المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$: $g(x) = 3 - \frac{6}{x+2}$

(C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$. (الوثيقة -1)

(1) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N} \rightarrow u_0 = 8$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = 3 - \frac{6}{U_n + 2}$

أ/ مثل على محور الفواصل الحدود : u_0, u_1, u_2, u_3 (دون حساب).

ب/ ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(2) أ/ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 8$.

ب/ بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1-u_n)}{u_n+2}$

ج/ حدّد اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أن (u_n) متقاربة.

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} كما يلي : $v_n = 1 - \frac{1}{U_n}$

أ/ يبين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب/ اكتب كلا من u_n و v_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n$

التمرين الثاني:

f دالة معرفة على \mathbb{R} : $f(x) = x + \frac{2}{1+e^x}$

(c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$

(1) تأكد أن : $f(x) = x + \frac{2e^{-x}}{1+e^{-x}}$

(2) عين دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} .

(3) احسب A مساحة الحيز المحدّد بالمنحنى (c_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما :

$x = 4$ و $x = 0$



المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (o, \vec{i}, \vec{j})
 (I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ كما يلي: $g(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln x$

- (1) احسب نهايات الدالة g عند طرفي مجال تعريفها.
- (2) ادرس اتجاه تغيير الدالة g .
- (3) يتبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $2 \left[\frac{3}{2}; \frac{3}{2} \right]$. فسّر النتيجة بيانياً.
- (4) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0, +\infty[$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ كما يلي $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$

- (1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجةين بيانياً.
- (2) أثبت أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$
- (3) استنتج اتجاه تغيير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) يتبين أن : $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$

(5) أكتب معادلة المماس (Δ) لـ (c_r) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$

(6) ارسم (c_r) و (Δ) . تأخذ : $\alpha = 1,89$ ، $f(\alpha) = 0,14$

(7) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $2 \ln x = x^3 + x + 2mx^2 + 2m$

اتمهي ...

بالتوفيق