

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

فيما يلي أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل مرة :

(1) الدالة  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $f(x) = \ln\left(\frac{x^2+2x+3}{x^2+2x+5}\right)$  و  $(C)$  تمثيلها البياني في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

☞ المستقيم ذا المعادلة  $x = -1$  هو محور التناظر لـ  $(C)$  .

(2)  $a$  عدد طبيعي حيث :  $a = 5^6 \times 25^{1443}$  ، عدد أرقام العدد  $a$  هو : 2022 .

(3) المتتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = \frac{1}{7}$  ، حدها الأول  $v_0$  و  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_0 + v_1 + \dots + v_n) = 2289$  إذن :  $v_0 = 1962$  .

(4) لاختبار أحد الطلبة وضع أستاذ الرياضيات في علبة خمسة أسئلة في الدوال و أربعة أسئلة في الإحتمالات وثلاثة أسئلة في المتتاليات ، على الطالب أن يسحب عشوائيا سؤالا ثلاث مرات على التوالي دون إرجاع .

☞ احتمال أن يسحب الطالب سؤال في الدوال وسؤال في الإحتمالات وسؤال في المتتاليات هو :  $\frac{3}{11}$  .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي الصندوق  $U_1$  على ثلاث كريات تحمل الأرقام : 2 ، 2 و 3 و يحتوي الصندوق  $U_2$  على تسع كريات منها أربعة خضراء تحمل كل منها الرقم 3 وخمس كريات حمراء تحمل الأرقام : 1 ، 2 ، 2 ، 3 و 4

( الكريات لا يمكن التمييز بينها باللمس ) نسحب عشوائيا كرية من الصندوق  $U_1$  ونسجل رقمها وليكن  $n$  .

إذا كان  $n=2$  : نسحب عشوائيا من الصندوق  $U_2$  كريتين على التوالي من دون إرجاع .

إذا كان  $n=3$  : نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كريات من الصندوق  $U_2$  .

- نعتبر الحدثين التاليين :  $A$  : " الكريات المسحوبة من الصندوق  $U_2$  لها نفس اللون " .

$B$  : " الكريات المسحوبة من الصندوق  $U_2$  تحمل نفس الرقم " .

(1) أ- بين أن :  $P(A) = \frac{19}{54}$  ، ثم احسب  $P(B)$  إحتمال الحدث  $B$  .

ب- بين أن :  $P(A \cap B) = \frac{55}{378}$  ، ثم إستنتج :  $P_A(B)$  .

ج- هل الحدثان  $A$  و  $B$  مستقلان ؟ علل إجابتك .

(2) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات الحمراء المسحوبة من الصندوق  $U_2$  .

- عين قانون الإحتمال للمتغير العشوائي  $X$  ، ثم أحسب أمله الرياضياتي  $E(X)$  .

**التمرين الثالث: (05 نقاط)**

المتتالية  $(u_n)$  معرفة على  $\mathbb{N}$  بـ :  $u_0 = 1$  و من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_{n+1} = \frac{5u_n}{3u_n + 5}$  .

(1) احسب كلا من :  $u_1$  ،  $u_2$  و  $u_3$  .

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فإن :  $u_n > 0$  .

(3) أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فإن :  $u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{5(u_{n+1} - u_n)}{6u_n + 5}$  .

ب- إستنتج أن الفرقين :  $u_{n+2} - u_{n+1}$  و  $u_{n+1} - u_n$  من نفس الإشارة .

ج- برهن بالتراجع أنه من أجل كل  $n$  من  $\mathbb{N}$  فإن :  $u_{n+1} - u_n < 0$  ، ثم استنتج إتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  .

د- هل المتتالية  $(u_n)$  متقاربة ؟ . برر إجابتك .

(4) نعتبر المتتالية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  كما يلي :  $v_n = \frac{5}{u_n}$  .

أ- بين أن المتتالية  $(v_n)$  حسابية يطلب تحديد أساسها و حدها الأول  $v_0$  .

ب- عبر عن  $v_n$  و  $u_n$  بدلالة  $n$  ، ثم احسب :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  .

(5) من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  نضع :  $S_n = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 3u_3v_3 + \dots + nu_nv_n$  .

- بين أنه من أجل كل  $n \in \mathbb{N}^*$  فإن :  $S_n = 5 \left( \frac{n^2 + n}{2} \right)$  .

**التمرين الرابع: (07 نقاط)**

(I) الدالة  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $f(x) = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$  ،  $(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد

المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  ، وحدة الطول هي  $2cm$  .

(1) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن :  $f(-x) + f(x) = 2$  ، ثم استنتج أن  $(C_f)$  يقبل النقطة  $A$  كمركز

التناظر يطلب تحديد إحداثيها .

ب- أحسب :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$  ، ثم فسر النتائج بيانيا .

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن :  $f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$  ، ثم استنتج إتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها .

(3) اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة  $0$  .

(II) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي :  $g(x) = f(x) - (x+1)$  .

(1) بين أنه من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}$  فإن :  $g'(x) = - \left( \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$  .

(2) عين إتجاه تغير الدالة  $g$  ، احسب  $g(0)$  ثم حدد إشارة  $g(x)$  .

(3) إستنتج وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(T)$  .

- (4) أ - بين أن :  $f(x)=x$  إذا فقط إذا كان :  $g(x)=-1$  .
- ب - إستنتج أن المستقيم  $(D)$  ذا المعادلة :  $y=x$  يقطع المنحنى  $(C_f)$  في نقطة واحدة فاصلتها  $\alpha$  حيث :  $2 < \alpha < 3$  .
- (5) أنشئ المماس  $(T)$  ، المنحنى  $(C_f)$  و مستقيمه المقاربين .
- (6)  $m$  وسيط حقيقي ، عين بيانيا قيم  $m$  حتى تقبل المعادلة :  $f(x)=mx+1$  حلان مختلفان في الإشارة و حل معدوم .
- (III) 1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  يكون :  $f(x)=\frac{4e^x}{e^x+1}-1$  ، ثم إستنتج دالة أصلية  $F$  للدالة  $f$  على  $\mathbb{R}$  .
- 2) احسب بـ :  $cm^2$  مساحة الحيز المستو المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  ، المستقيم  $(D)$  و حامل محور الترتيب والمستقيم الذي معادلته  $x=1$  .

إنتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (05 نقاط)

المتتالية  $(u_n)$  معرفة على  $\mathbb{N}$  بـ :  $u_0 = 1$  و من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2+2^n \cdot u_n}$  .

(1) احسب  $u_1$  .

(2) أ - بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $u_n > 0$  .

ب - ادرس رتبة المتتالية  $(u_n)$  ، ثم استنتج أنها متقاربة .

(3) نعرف على  $\mathbb{N}$  المتتالية  $(v_n)$  كما يلي :  $v_n = \frac{1}{2^n \cdot u_n}$  .

أ - برهن أن المتتالية  $(v_n)$  حسابية يطلب تحديد أساسها و حدها الأول  $v_0$  .

ب - اكتب عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$  ، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فإن :  $u_n = \frac{1}{(n+2)2^{n-1}}$  .

ج - احسب :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  .

(4) نضع من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $S_n = u_0 \cdot v_0 + u_1 \cdot v_1 + \dots + u_n \cdot v_n$  .


أ- بين أنه من أجل كل  $n \in \mathbb{N}$  :  $S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$  .

ب- عين أكبر قيمة للعدد الطبيعي  $n$  التي من أجلها يكون :  $S_n \leq 1,9999$  .

### التمرين الثاني: (05 نقاط)

يحتوي صندوق على أربع كريات سوداء و كرية واحدة بيضاء ( كل الكريات متماثلة ولا فرق بينها عند اللمس ) .  
 نعتبر اللعبة التالية : يقوم اللاعب برمي زهر نرد متزن مرقم من 1 إلى 6 ، إذا كان الرقم الظاهر فرديا نضيف كرية بيضاء في الصندوق و إذا كان الرقم الظاهر زوجيا نضيف كرية سوداء في الصندوق ، بعد ذلك يسحب اللاعب في آن واحد ثلاث كريات من الصندوق .

نعبر الأحداث التالية :  $I$  " الرقم الظاهر فردي " ،  $N$  " الكريات الثلاث المسحوبة سوداء " .



(1) احسب الإحتمالات :  $P(I)$  ،  $P(N)$  ،  $P(N \cap I)$  و  $P(N \cap \bar{I})$  .

(2) أ - أنقل شجرة الإحتمالات المقابلة التي تنمذج هذه التجربة

ثم أكملها .

ب - بين أن :  $P(N) = \frac{7}{20}$  .

(3) علما أن الكريات المسحوبة كلها سوداء ، ما إحتمال أن يكون

الرقم الظاهر زوجيا ؟ .

4) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكريات البيضاء المسحوبة .

أ - بين أن :  $P(X=1) = \frac{11}{20}$  .

ب - عرف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي  $X$  .

ج - أعط تقديرا للقيمة المتوسطة لعدد الكريات البيضاء المسحوبة ، ثم استنتج التباين  $V(X)$  .

### التمرين الثالث: (03 نقاط)

نعتبر التكاملين التاليين :  $I = \int_0^{\ln 2} \frac{3e^x + 2}{e^x + 1} dx$  و  $J = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x} + 3e^x + 1}{e^x + 1} dx$  .

1) أ - تحقق أن :  $I - J = \int_0^{\ln 2} (1 - e^x) dx$  .

ب - استنتج أن :  $I - J = \ln 2 - 1$  .

2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $\frac{e^{2x} + 3e^x + 1}{e^x + 1} = e^x + 1 + \frac{e^x}{e^x + 1}$  .

3) احسب  $J$  ، ثم استنتج  $I$  .

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

I) الدالة  $g$  معرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = \frac{\ln x}{x} + 1$  .

1) احسب نهايتي الدالة  $g$  عند حدود مجموعة تعريفها .

2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  و شكل جدول تغيراتها .

3) بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  ينتمي إلى المجال  $]0,5; 0,6[$  .

4) استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  .

II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي :  $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + x - 1$  و ليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

1) احسب كلا من :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و فسر بيانيا النهاية عند  $0$  .

2) أ - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $]0; +\infty[$  فإن :  $f'(x) = g(x)$  .

ب - استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها .

3) أ - اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحني  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة  $1$  .

ب - ادرس الوضع النسبي للمنحني  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(T)$  .

4) أنشئ  $(T)$  ، ثم مثل  $(C_f)$  . ( نضع :  $f(\alpha) \approx -0,3$  )

5) الدالة  $h$  معرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ :  $h(x) = -\frac{1}{2}(\ln|x|)^2 - |x| + 1$  و  $(C_h)$  تمثيلها البياني في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

أ - اثبت أن الدالة  $h$  زوجية .

ب - اشرح كيفية تمثيل المنحنى  $(C_h)$  انطلاقا من  $(C_f)$  ، ثم مثله .

(6)  $m$  وسيط حقيقي ، نعتبر المستقيمات  $(\Delta_m)$  المعرفة بالمعادلة :  $y = mx - m$  .

أ - بين أن جميع المستقيمات  $(\Delta_m)$  تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيين إحداثيها .

ب - ناقش بيانيا و حسب قيم العدد الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة :  $f(x) = mx - m$  .

(7) أ - بين أن الدالة  $x \mapsto x \ln x - x$  هي دالة أصلية للدالة  $x \mapsto \ln x$  على  $]0; +\infty[$  .

ب - باستعمال التكامل بالتجزئة عبر عن العدد  $A(\lambda)$  بدلالة  $\lambda$  حيث :  $0 < \lambda < 1$  و  $A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 (\ln x)^2 dx$  .

ج - احسب بدلالة  $\lambda$  مساحة الحيز المستو المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  ، المماس  $(T)$  و المستقيمين اللذين معادلتها :

$$x = \lambda , x = 1$$

إنتهى الموضوع الثاني

