


ملاحظة: عالج أحد الموضوعين على الخيار

### الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات ( من الصفحة 1 من 10 الى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (5 نقاط)

تقوم العصبونات المحركة على مستوى النخاع الشوكي بدمج الرسائل العصبية المتدخلة في الحركات الارادية أو الانعكاسية، الوثيقة التالية تمثل بعض التجارب التي تم اجرائها على عصبونات حركية في مستوى النخاع الشوكي.



- 1- أذكر مختلف البروتينات المتدخلة في توليد و انتشار الرسالة العصبية من عدمها على مستوى ا لمشبك (مشبك تنبيهي / مشبك تثبيطي) محددًا دور كل منها.
- 2- انطلاقًا من معطيات الوثيقة و معارفك أكتب نصًا علميًا تبين فيه آلية دمج الرسائل العصبية على مستوى العصبون المحرك.

التمرين الثاني : (07نقاط)

طورت بعض الحشرات كالنحل آليات دفاعية بديلة ضد حالات العدوى البكتيرية، رغم افتقارها لنظم و آليات مناعية.

بينت الأبحاث العلمية احتواء السائل اللمفاوي المعزول من نحل العسل من سلالة (Mellifera Apis) على عائلة جديدة من المضادات الحيوية الببتيدية تعرف apidaecins الموجهة ضد مجموعة واسعة من

البكتيريا، التي يمكن أن تستهدف خلايا النحل وتسبب بعض الأمراض البشرية. لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins نقترح الدراسة التالية.

### الجزء الأول:


تتضمن الوثيقة (01) ثلاثة أشكال:

يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي مبسط لمراحل آلية التعبير المورثي عند حقيقيات النواة. يمثل الشكلين (ب) و (ج) نتائج التجربتين 01 و 02 على الترتيب و التي أجريت على السائل للمفاوي للنحل.

**التجربة 01:** في وجود مستخلص خلوي بكتيري لا يتضمن متطلبات تركيب البروتين نحضر أوساط تجريبية مختلفة: **الوسط التجريبي 1:** المستخلص الخلوي مع إضافة شروط الظاهرة (a) + سائل لمفاوي معزول من نحل العسل من سلالة (*mellifera Apis*).

**الوسط التجريبي 2:** العنصر (2) من الشكل (أ) + شروط الظاهرة (b) + سائل لمفاوي. نتائج الدراسة المتعلقة بقياس النسبة المئوية للعنصر (2) الحرة وكذا الكثافة التراكمية تحت وحدات الريبوزومات و النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (01).

**التجربة 02:** في وجود مستخلص خلوي بكتيري يحتوي على شروط الترجمة و في وجود أو غياب السائل للمفاوي المعزول من نحل العسل، نقوم بقياس كمية البروتين المتشكلة، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة (01).




1- باستغلالك لأشكال الوثيقة (01) استدل على أن:

- الظاهرة (a) هي امتداد للظاهرة (b).
- المضاد الحيوي apidaecins لا يستهدف الظاهرة (a) و لا الظاهرة (b).
- في وجود المضاد الحيوي يتنشط تركيب البروتين.

## الجزء الثاني:

قصد تفسير آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins على تركيب البروتين نحقق الدراسة التالية:



**تجربة:** نطبق تقنية العالمين **Philip و Nirenberg** حيث نحضر خ متكون من شروط الظاهرة (b) مع سائل لمفاوي معزول من نحل الع من سلالة **Apis mellifera** لاحقا يتم إدخال الخليط بعد إعطاءه ه كافية لتركيب البروتين ضمن تركيب تجريبي مكون من غرفتين يفص غشاء نفوذ مكون من مادة نترات السيليلوز وتتبع ظهور الاشعاع في الغرفتين العلوية والسفلية والمعطيات التجريبية و نتائجها ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة (02).

**ملاحظة:** غشاء نترات السيليلوز يسمح بعبور جميع الجزيئات ما عدا الوحدات الريبوزومية الوظيفية:

يمثل الشكل (2) من الوثيقة (02) آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins.


الخليط (4)	الخليط (3)	الخليط (2)	الخليط (1)	الخلاط المكونات
30 S + 50 S + ARNt- Phe* متعدد ATP + U	30S* + 50S* + ARNt- Phe* متعدد ATP + U	30S* + 50S* + ARNt- Phe متعدد ATP + U	30S* + 50S* + ARNt- Phe متعدد ATP + U	
نعم	نعم	نعم	لا	إضافة السائل المفاوي للنحل من سلالة (Apis mellifera)
0	*	*	0	الاشعاع في الغرفة العلوية
*	*	0	*	الاشعاع في الغرفة السفلية

**ملاحظة:** الرامزة UUU تعبر عن الحمض الأميني فينيل ألانين (Phe).

\* : وجود الاشعاع / 0 : غياب الاشعاع

50S: تحت وحدة ريبوزومية كبرى / 30S: تحت وحدة ريبوزومية صغرى

الشكل (1)



## الوثيقة 02


1- فسر النتائج المحصل عليها في كل خليط.  
2- معتمدا على معطيات الشكل (2) للوثيقة (02) حدد بدقة طريقة تأثير المضاد الحيوي **apidaecins** مبرزا الفاعلية الطبية لعسل النحل لمعالجة الاصابات البكتيرية التي تستهدف الانسان.

### التمرين الثالث: (8نقاط)

تدخل الانزيمات في تفاعلات حيوية جد نوعية بفضل بنيتها الدقيقة، الا أن تأثير بعض عوامل الوسط عليها قد تؤدي الى اختلالات صحية.

#### الجزء الأول:

يعاني بعض الأشخاص من أعراض فقر دم حاد ولغرض تحديد سبب هذا النوع من فقر الدم نقدم لك الشكل (أ) من الوثيقة (01) الذي يمثل مخطط بعض التفاعلات المؤدية الى تركيب جزيئة الهيم التي تدخل بدورها في تركيب جزيئة الهيموغلوبين عند شخص سليم، بينما يمثل الشكل (ب) نتائج قياس تركيز الهيموغلوبين في الدم المركب بدلالة تركيز عنصر الرصاص في الدم



## الوثيقة 01

1 - حلل مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (01).  
2- باستغلالك الشكل (ب) من الوثيقة (01) صغ المشكل العلمي.




#### الجزء الثاني:

تم في تجربة تحضير وسطين (1) و(2) يحتوي كل منهما على كمية ابتدائية تقدر بـ20 وحدة اعتبارية من حمض أمينوليفولينيك (ALA) Aminolevulinic Acid وذلك في وجود كل من انزيم Ala-d و انزيم cop و انزيم Fech مع وجود الحديد في الوسط، يضاف للوسط (2) عنصر الرصاص. بعد ذلك تم قياس تركيز المواد المتواجدة في كل وسط فتحصلنا على النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (02). بينما الشكل (ب) من الوثيقة (02) يبين آلية عمل أنزيم Aminolevulinic Acid dehydratase (ALA-d) أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيمثل بنية انزيم ALA-d باستعمال برنامج


راستوب في الحالة الطبيعية و الغير طبيعية.

الوسط 2		الشكل أ	الوسط 1	
تركيز المواد خلال التجربة	تركيز المواد الا بتدائي		تركيز المواد خلال التجربة	تركيز المواد الا بتدائي
20 و.أ	20 و.أ	Aminolevulinic	00 و.أ	20 و.أ
00 و.أ	00 و.أ	porphobilinogène	10 و.أ	00 و.أ
00 و.أ	00 و.أ	protoporphyrin	10 و.أ	00 و.أ
غير موجود	غير	الهيم	20 و.أ	غير موجود

K	C	اللفة أحادية الأحرف للأحماض الا
lys	cys	اللفة ثلاثية الأحرف للأحماض الأمينية



Ala-d مرتبط بالزنك (حالة طبيعية)



Ala-d مرتبط بالرصاص (حالة غير طبيعية)

الوثيقة

- 1- فسر النتائج المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة (02).
- 2- باستغلالك الشكلين (ب) و(ج)، قدم حلا للمشكل العلمي المطروح مبرزا سبب هذا النوع من فقر الدم.

الجزء الثالث:

انجز مخططا يوضح العلاقة بين النمط الوراثي و التخصص الوظيفي للانزيمات (ALA-d) ، ( cop) ، ( Fech) مبرزا تأثير مادة الرصاص في الاصابة بفقر الدم.

اختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا تجريبي 2022

## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (5) صفحات (من الصفحة 6 من 10 الى الصفحة 10/10)

### التمرين الأول: (5 نقاط)

يتم تركيب البروتين بسلسلة من الآليات المحددة والمنظمة تتم بواسطة عناصر نووية وهيولية ، تتطرق الدراسة التالية إلى أحد الأنشطة المرتبطة بتركيب البروتين ، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية بعض التفاصيل الخاصة بالنشاط المدروس أما الشكل (ب) فيمثل كود الشفرة الوراثية .

الشكل

الشكل أ

				العنصر
				2
				الحمض
				الأ

الشكل ج

1- ضع البيانات المرقمة محددًا الأحماض الأمينية الموافقة لكل جزيئة من الجزيئات الممثلة في الرسم بالاستعانة بجدول الشكل (ج)، ثم سم النشاط المدروس محددًا نوع التفاعل الحادث مع كتابة معادلته الكيميائية .


2- باستغلال معطيات الوثيقة ومعارفك المكتسبة ، بين في نص علمي أن الخصائص البنيوية للعنصر (1) تسمح بتأمين الربط بين المعلومة الوراثية والأحماض الأمينية الموافقة لها وعلاقتها بالتخصص الوظيفي للبروتين.

## التمرين الثاني : (07 نقاط)

الصرع ( Epilensie ) هو مجموعة من الإضطرابات العصبية يظهر جراء عدم انتظام نشاط الخلايا العصبية التي تنتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية على مستوى المخ وتتميز بحدوث نوبات متكررة يمكن أن تختلف نوبات الصرع من فترات قصيرة وغير قابلة للكشف تقريبا إلى فترات طويلة من التشنج الشديد، يظهر هذا المرض بشكل عام في مرحلة الطفولة أو لدى البالغين فوق سن 65 سنة ، ومع هذا قد يظهر مرض الصرع في أية مرحلة عمرية.  
- من أجل دراسة سبب هذا المرض وأعراضه الخاصة نعرض عليك ما يلي :

### الجزء الأول:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) بنية مشبك مثير مأخوذ من المخ ، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح التسجيلات الكهربائية على مستوى الغشاء بعد مشبكي فيه بعد مرور السيالة العصبية ، وذلك لدى شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالصرع .



الوثيقة 1

1- اشرح المراحل المرقمة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) ، ثم حلل تسجيلات الشكل (ب) الممثلة بها.

## الجزء الثاني:

- لتحديد سبب المرض قام العلماء بالتحليل الشاردي في حالة الراحة للوسطين الداخل والخارج خلويين ، وهذا على مستوى مشبكين أحدهما لشخص سليم ، والآخر لشخص مصاب كما يبينه الشكل (أ) من الوثيقة (2) أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل جزء من الغشاء البعد مشبكي عند نفس الشخصين .

الشخص السليم				الشخص المصاب			
الشوارد	$^{+}Na$	$^{+}K$	$^{-}Cl$	الشوارد	$^{+}Na$	$^{+}K$	$^{-}Cl$
الوسط خارج خلوي mM	145	5	150	الوسط خارج خلوي mM	145	5	7
الوسط داخل خلوي mM	10	140	7	الوسط داخل خلوي mM	10	140	150

الشكل أ

الشكل ب

الوثيقة 02

1- باستغلالك لشكلي الوثيقة (02) - أبرز دور البروتينات الغشائية في الإصابة بمرض الصرع.


## التمرين الثالث: (08 نقاط)

مثبطات المناعة هي مركبات تمنح اللاذات القدرة على الإفلات من سيرورة الإستجابة المناعية النوعية .  
 -يعتبر مركب Sirolimus كمثبط مناعي يعتمد كعلاج طبي لزراعة الطعوم ( زراعة الكلى) أو العلاجات المرتبطة بأمراض المناعة الذاتية.  
 -تملك بكتيريا المكورات العنقودية مثبطات مناعية غير مرغوب فيها تعرف بعوامل الضراوة تسمح لها بـ

العيش بوتيرة سريعة ومتطورة إلى جانب مقاومتها للمضادات الحيوية مسببة الامراض التنفسية.  
- نستهدف خلال هذه الدراسة التعرف على التأثير المتباين للمثبطات المناعية على سيرورة الإستجابة المناعية النوعية

## الجزء الأول:

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (02) جانبا من مراحل ظهور الخلية (خ2) وكذا نشاطها السمي حيث: ( $^{51}\text{Cr}^*$  ينفذ إلى هيولي الخلية ويثبت على بروتيناتها ويتم تحريره عند انحلالها). بينما يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة تطور النسب المئوية لرفض الطعام وتطور الظواهر الخلوية والجزئية المرافقة للرد المناعي في وجوب مركب Sirolimus وفي غيابه.  
- الشكل (3) يمثل تطور النسب المئوية لتكاثر بكتيريا المكورات العنقودية وكذا المعقدات المناعية (Ag-Ig) والنسب المئوية لنشاط المستقبلات الغشائية للبالعات (الماكروفاج) بعد الإصابة.



الوثيقة 01

1- باستغلالك المنظم لمعطيات وأشكال الوثيقة (01)، بين التأثيرات البيولوجية للأجسام المضادة.  
2- اقترح فرضيتين تفسيران بها تأثير كل من مركب Sirolimus (الإجراء الطبي المعتمد خلال زراعة الطعوم) وكذا المثبطات البكتيرية غير المرغوب فيها (عوامل الضراوة) على سيرورة الرد المناعي النوعي.


## الجزء الثاني:

- قصد التحقق من صحة الفرضيتين نقترح الدراسة التالية:

**المعطي (1):** توضع خلايا (1 خ) محسنة بالمستضد في وسط يتضمن تايميدين مشع ( $T^*$ ) حيث نخضعها لشروط تجريبية مختلفة . يتم لاحقا قياس نشاط الدورة الخلوية وكمية ( $T^*$ ) التايميدين المدمجة ونسبة الخلايا (1 خ) في الوسط حيث:

- الوسط 1:** خلايا (1 خ) + تايميدين مشع ( $T^*$ ) النتائج ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة (02) .  
**الوسط 2:** خلايا (1 خ) + il2 + تايميدين مشع (T) النتائج ممثلة في الشكل (2) من الوثيقة (02).  
**الوسط 3:** خلايا (1 خ) + il2 + تايميدين مشع (T) + مركب Sirolimus النتائج ممثلة في الشكل (3) من الوثيقة (02).

**المعطي (2):** تمثل الوثيقة (03) رسم تخطيطي لإحدى مراحل الإستجابة المناعية الموجهة ضد بكتيريا المكورات العنقودية .



1- برهن على صحة الفرضيتين المقترحتين .

**الجزء الثالث:**

مستعينا بنتائج هذه الدراسة ومكتسباتك أنجز مخططا تفسيريا تبرز من خلاله التأثير المتباين للمثبطات

المناعية (مركب Sirolimus وعوامل الضراوة ) على سيرورة الإستجابة المناعية النوعية.

إما النجاح أو التفوق.....طموحنا هو  
نجاحكم بكالوريا 2022

