

المستقيمات والمستويات

Droites et Plans dans l'espace

تمرين 1

- ليكن الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- 1- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم d_1 الذي يشمل النقطة $A(2; 1; -1)$ و $\vec{u}(1; -2; 3)$ شعاع توجيه له.
- 2- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم d_2 الذي يشمل النقطتين $B(3; 2; 2)$ و $C(2; 3; -1)$. هل d_2 يشمل $D(3; 2; 0)$ ؟
- 3- عين إحداثيات النقطة I تقاطع المستقيمين d_1 و d_2 .
- 4- نعتبر المستقيم d_3 الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = -2\lambda + 1 \\ y = 4\lambda - 3 \\ z = \lambda + 5 \end{cases} \quad \lambda \text{ عدد حقيقي}$$

هل d_1 و d_3 متوازيان؟ متقاطعان؟ ليسا من نفس المستوي؟

$$(0; 5; -7) \quad (-\alpha+3; \alpha+2; -3\alpha+2) \quad (t+2; -2t+1; 3t-1)$$

تمرين 2

- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر المستويات التالية: $\mathcal{P}_1: x - 2y + z - 3 = 0$ ، $\mathcal{P}_2: -2x + y + z = 0$ و $\mathcal{P}_3: x + y + z - 6 = 0$.
- 1- بين أن المستويين $\mathcal{P}_1$ و $\mathcal{P}_2$ يتقاطعان. عين التمثيل الوسيطى للمستقيم $\mathcal{D}$ تقاطع المستويين $\mathcal{P}_1$ و $\mathcal{P}_2$.
- 2- بين أن $\mathcal{P}_3$ و $\mathcal{D}$ يتقاطعان في نقطة I يطلب تعيينها.
- 3- استنتج مما سبق مجموعة حلول الجملة التالية:

$$\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0 \\ -2x + y + z = 0 \\ x + y + z - 6 = 0 \end{cases}$$

$$(2; 1; 3) \quad (t-1; t-2; t)$$

تمرين 3

فسر هندسيا الجملتين التاليتين واستنتج مجموعة الحلول في $\mathbb{R}^3$.

$$S_2 \begin{cases} x + 2y + 3z = 9 \\ 3x - y - z = -2 \\ -x + 5y + 3z = 0 \end{cases} \quad S_1 \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ 4x + 2y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$(0; -3; 5) \quad \phi$$

تمرين 4 Bac S France 2007

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر المستويين: $\mathcal{P}: x + 2y - z + 1 = 0$ و $\mathcal{P}': -x + y + z = 0$. لتكن النقطة $A(0; 1; 1)$.

1- بين أن المستويين $\mathcal{P}$ و $\mathcal{P}'$ متعامدان.

2- نعتبر المستقيم d الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + t \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = t \end{cases} \quad t \text{ عدد حقيقي}$$

بين أن المستويين $\mathcal{P}$ و $\mathcal{P}'$ يتقاطعان وفق المستقيم d .

3- احسب بعد النقطة A عن كل من المستويين $\mathcal{P}$ و $\mathcal{P}'$.

4- استنتج المسافة بين النقطة A والمستقيم d .

$$\sqrt{2}, 2/\sqrt{3}, 2/\sqrt{6}$$

تمرين 5 Bac S Nouvelle-Calédonie 2007

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

- 1- اكتب المعادلة الديكارتية للمستوي الذي يشمل النقطة $M_0(x_0; y_0; z_0)$ و $\vec{n}(a; b; c)$ شعاع ناظمي له.
- 2- لتكن النقاط: $A(1; 2; -3)$ ، $B(-3; 1; 4)$ و $C(2; 6; -1)$.
(أ) بين أن النقاط A ، B و C تعين مستويا.
(ب) تأكد أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي $2x - y + z + 3 = 0$.

- (ج) لتكن النقطة $I(-5; 9; 4)$. أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم $\mathcal{D}$ الذي يشمل النقطة I وعمودي على المستوي (ABC) .
(د) عين إحداثيات النقطة J ، تقاطع $\mathcal{D}$ مع المستوي (ABC) .
(هـ) استنتج المسافة بين النقطة I والمستوي (ABC) .

$$2\sqrt{6} \quad J(-1; 7; 6) \quad (2t-5; -t+9; t+4)$$

تمرين 6 Bac S Polynésie 2008

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط: $A(1; 2; 3)$ ، $B(0; 1; 4)$ ، $C(-1; -3; 2)$ ،

$D(4; -2; 5)$ والشعاع $\vec{n}(2; -1; 1)$.

1- (أ) بين أن النقط A ، B و C ليست على استقامة.

(ب) بين أن $\vec{n}$ شعاع ناظمي للمستوي (ABC) .

(ج) اكتب المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) .

2- نعتبر المستقيم (Δ) الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 4 - t \end{cases} \quad t \text{ عدد حقيقي}$$

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير على ما يلي:

- 1- النقطة A تنتمي إلى المستقيم $\mathcal{D}$.
- 2- النقطة A تنتمي إلى المستوي $\mathcal{P}$.
- 3- المستقيم $\mathcal{D}$ والمستوي $\mathcal{P}$ يتقاطعان في $I(8; -1; -1)$.
- 4- المستقيم (AB) والمستوي $\mathcal{P}$ متوازيان.
- 5- مجموعة النقط M من الفضاء حيث $MA = MB$ هي $\mathcal{P}$.
- 6- تقاطع المستوي $\mathcal{P}$ مع سطح الكرة التي مركزها A وتشمل النقطة B هي دائرة.
- 7- المستقيم $\mathcal{D}$ يوازي المحور $(O; \vec{i})$.

خطأ 7	خطأ 5	صحيح 1	صحيح 4	خطأ 2	صحيح 6	صحيح 3
-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

تمرين 9 Bac S Centres étrangers 2008

- الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط: $A(2; 1; -1)$ ، $B(-1; 2; 4)$ ، $C(0; -2; 3)$ ، $D(1; 1; -2)$ والمستوي $\mathcal{P}: x - 2y + z + 1 = 0$.
- أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير على ما يلي:
- 1- النقط A، B و C تعين مستويا.
 - 2- المستقيم (AC) ينتمي إلى المستوي $\mathcal{P}$.
 - 3- المعادلة الديكارتية للمستوي (ABD) هي: $x + 8y - z - 11 = 0$.
 - 4- التمثيل الوسيطى للمستقيم (AC) هو:

$$\begin{cases} x = 2k \\ y = -2 + 3k \\ z = 3 - 4k \end{cases} \quad k \text{ عدد حقيقي}$$

- 5- المستقيمان (AB) و (CD) متعامدان.
- 6- المسافة بين النقطة C والمستوي $\mathcal{P}$ تساوي $4\sqrt{6}$.
- 7- سطح الكرة التي مركزها D ونصف قطرها $\frac{\sqrt{6}}{3}$ مماسية للمستوي $\mathcal{P}$.
- 8- النقطة $E\left(-\frac{4}{3}; \frac{2}{3}; \frac{5}{3}\right)$ هي المسقط العمودي للنقطة C على المستوي $\mathcal{P}$.

خطأ 2	خطأ 6	صحيح 4	صحيح 8	خطأ 5	صحيح 1	صحيح 7	صحيح 3
-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------


بين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم (Δ) وأن هذا المستقيم عمودي على المستوي (ABC).

3- لنكن E المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC). بين أن النقطة E هي مركز ثقل المثلث ABC.

$$E(0; 0; 3) \quad 2x - y + z - 3 = 0$$

تمرين 7 Bac S Antilles-Guyane 2007

- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقطتين: $A(3; 0; 6)$ و $I(0; 0; 6)$ ، نسمي (D) المستقيم الذي يشمل النقطتين A و I. نعتبر المستويين التاليين: (P): $2y + z - 6 = 0$ ، (Q): $y - 2z + 12 = 0$.
- 1- بين أن المستويين (P) و (Q) متعامدان.
 - 2- بين أن تقاطع المستويين (P) و (Q) هو المستقيم (D).
 - 3- بين أن المستويين (P) و (Q) يقطعان المحور $(O; \vec{j})$ وحدد إحداثيات النقطتين B و C، تقاطع المستويين (P) و (Q) على الترتيب مع $(O; \vec{j})$.
 - 4- بين أن معادلة المستوي (T) الذي يشمل النقطة B وشعاعه الناظمي $\vec{AC}$ هي $x + 4y + 2z - 12 = 0$.
 - 5- أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم (OA). بين أن المستقيم (OA) والمستوي (T) يتقاطعان في نقطة H يطلب تحديدها.
 - 6- ماذا تمثل النقطة H بالنسبة للمثلث ABC؟ علل.



$$H(2, 4; 0; 4, 8) \quad (3t; 0; 6t) \quad C(0; -12; 0) \quad B(0; 3; 0)$$

تمرين 8

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر المستقيم $\mathcal{D}$ الذي تمثيله الوسيطى:

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad t \text{ عدد حقيقي}$$

- نعتبر النقطتين: $A(2; 1; 3)$ و $B(5; -2; 2)$.
- نعتبر المستوي $\mathcal{P}$ الذي معادلته $x + 3z - 5 = 0$.