


العلامة			
مجموع	مجراة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
التمرين الأول (06 نقاط)			
3.5	2	<p>أ) باقي القسمة الإقلية للعدد <math>a</math> على 5 هو 3</p> <p>باقي القسمة الإقلية للعدد <math>b</math> على 5 هو 4</p>	1
	$3 \times 0.5$	<p>ب) باقي القسمة الإقلية للعدد <math>a^3 + b^2 + 2</math> على 5 هو 0</p> $a^3 + b^2 + 2 \equiv 0[5], b^2 \equiv 1[5] \text{ و } a^3 \equiv 2[5]$	
1.5	0.5	<p>أ) تبيان أن <math>b \equiv -1[5]</math></p> $b \equiv -1[5] \text{ إذن } b \equiv 4[5]$	2
	$2 \times 0.5$	<p>ب) التحقق أن العدد <math>b^{2024} - 1</math> يقبل القسمة على 5</p> $b^{2024} - 1 \equiv 0[5], b^{2024} \equiv (-1)^{2024}[5], b \equiv -1[5]$	
1	0.5	<p>أ) استنتاج أنه: من أجل كل عدد طبيعي <math>n</math> ،</p> $b^{2n} \equiv 1[5] \text{ و منه } b \equiv -1[5]$	3
	$2 \times 0.25$	<p>ب) تعين قيم العدد الطبيعي <math>n</math> التي من أجلها يكون:</p> $a + b^{2n} - bn \equiv 0[5] \text{ و } n = 5k+1, n+4 \equiv 0[5]$	
التمرين الثاني (06 نقاط)			
1.5	$3 \times 0.5$	$u_2 = 8, u_1 = 3, u_0 = -2$	1
1.5	$2 \times 0.5$	<p>أ) تبيان أن <math>(u_n)</math> حسابية وتعين أساسها <math>r</math></p> $r = 5 \text{ و } u_{n+1} - u_n = 5$	2
	0.5	<p>ب) استنتاج اتجاه تغير المتتالية <math>(u_n)</math></p> <p>إذن <math>r = 5</math> متزايدة تماما</p>	


1	2x0.5	تبين أن 2023 حد من حدود المتتالية ( $u_n$ ) ثم استنتاج رتبته 406 تكافئ $u_n = 5n - 2$	3
1	2x0.5	$u_0 + u_1 + \dots + u_{405} = 410263$ التحقق أن: $u_0 + u_1 + \dots + u_{405} = 410263$ ، $u_0 + u_1 + \dots + u_{405} = \frac{406}{2}(-2 + 2023)$	4
1	2x0.25	أ) تعين $r$ أساس المتتالية ( $v_n$ ) وحدّها الأول $v_0$ $v_0 = -2$ و $r = 5$	5
	0.5	ب) تعين عبارة الحد العام $v_n$ بدلالة $n$ : $v_n = 5n - 2$	
التمرين الثالث (08 نقاط)			
1	2X0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	1
3	0.75	أ) من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $f'(x) = x^2 - 2x$	2
	0.25	من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $f'(x) = x(x-2)$	
3	0.5	ب) إشارة $f'(x)$ الدالة $f$ متزايدة تماما على كل من المجالين $[2; +\infty]$ و $[-\infty; 0]$ و متناقصة تماما على المجال $[0; 2]$	
	0.5	ج) جدول التغيرات	
1	2x0.5	التحقق أن: $y = -x + \frac{1}{3}$ معادلة $L(T)$ $y = -x + \frac{1}{3}$ و منه $y = f'(1)(x-1) + f(1)$	3
1.5	0.5	أ) التتحقق أنه: من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $f(x) = \frac{1}{3}(x-3)x^2$	4
	0.5	ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ أو $x = 3$ أو $x = 0$ تكافئ $f(x) = 0$	
	2X0.25	ج) إحداثي نقطتي تقاطع $(C_f)$ مع حامل محور الفواصل هما $(0; 0)$ و $(3; 0)$	



ملاحظة: تُقبل وثّاعي جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني )
مجموع	جزأة	
التمرين الأول (06 نقاط)		
2.5	1	a) تعين باقي القسمة الإقلية لكـ من العددين $a$ و $b$ على 7 باـيـ القـسـمـةـ الإـقـلـيـدـيـةـ لـلـعـدـدـ $a$ عـلـىـ 7ـ هـوـ 6
	1	باـيـ القـسـمـةـ الإـقـلـيـدـيـةـ لـلـعـدـدـ $b$ عـلـىـ 7ـ هـوـ 1
1.5	0.5	b) تـبـيـانـ أـنـ: $a \equiv -1[7]$ $a \equiv -1[7]$ ، اـذـنـ $a \equiv 6-7[7]$ ، اـذـنـ $a \equiv 6[7]$ ومنـهـ $a \equiv 6[7]$ لدينا $[7]$
	2X0.75	استـنـتـاجـ أـنـ العـدـدـ $a^2$ و $b^2$ متـوـافـقاـنـ بـتـرـدـيدـ 7 $b^2 \equiv 1[7]$ و $a^2 \equiv 1[7]$
0.5	0.5	تبـيـانـ أـنـ العـدـدـ $a^2 + b^2$ يـقـبـلـ القـسـمـةـ عـلـىـ 7 $a^2 + b^2 - 2 \equiv 0[7]$
1.5	0.5	a) تـبـيـانـ أـنـهـ: منـ أـجـلـ كـلـ عـدـدـ طـبـيعـيـ $n$ ، $a^{2n} \equiv 1[7]$ لـديـنـاـ $a \equiv -1[7]$ اـذـنـ منـ أـجـلـ كـلـ عـدـدـ طـبـيعـيـ $n$ ، $a^{2n} \equiv 1[7]$
	0.5	b) تعـيـنـ قـيـمـ العـدـدـ الطـبـيعـيـ $n$ التـيـ مـنـ أـجـلـهاـ يـكـونـ: $a^{2n} + bn + 1 \equiv 0[7]$ $1 + n + 1 \equiv 0[7]$ تـكـافـيـ $a^{2n} + bn + 1 \equiv 0[7]$ $n \equiv 5[7]$ تـكـافـيـ $n = 7k + 5$ حيثـ $k$ عـدـدـ طـبـيعـيـ وـمـنـهـ
التمرين الثاني (06 نقاط)		
1	0.5	تبـيـانـ أـنـ: $u_0 = 5$
	0.5	$u_0q^2 + u_0q^3 = 60$ تـكـافـيـ $u_2 + u_3 = 60$
	0.5	$u_0 = 5$ وـمـنـهـ $12u_0 = 60$ تـكـافـيـ

1	2x0.5	$u_6 = 320$ ، $u_6$ هو $7$ الحد الذي رتبته $7$	2
3	2x0.5	$u_n = 5 \times 2^n$ ، $u_n = u_0 q^n$ $n$ بدلالة $n$ ) تعين عبارة الحد العام	3
	1	$u_{n+1} - u_n = 5 \times 2^n$ ، $n$ ) تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_{n+1} - u_n = 5 \times 2^n$ ، $n$ متزايدة تماما.	
	1	ج) استنتاج أن $(u_n)$ متزايدة تماما من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $2^n > 0$ إذن $(u_n)$ متزايدة تماما.	
1	2x0.5	$u_0 + u_1 + \dots + u_n = 5 \times 2^{n+1} - 5$ ، $n$ ، $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$ تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_0 + u_1 + \dots + u_n = 5 \times 2^{n+1} - 5$ ، $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$	4
التمرين الثالث (08 نقاط)			
1	2x0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$	1
3	2x0.5	أ) من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $g'(x) = -3(x-1)(x+1)$ و $g'(x) = -3x^2 + 3$	2
	0.5	ب) إشارة $g'(x)$ الذالة $g$ متاقصة تماما على كل من المجالين $[-1; +\infty)$ و $[1; +\infty)$ و متزايدة تماما على المجال $[-1; 1]$	
	1	ج) جدول التغيرات	
1.75	0.5	$g(x) = (2-x)(x+1)^2$ التتحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $g(x) = 0$ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة	3
	0.5	$x = -1$ أو $x = 2$ تكافئ $g(x) = 0$	
	3x0.25	ج) تعين إحداثيات نقط تقاطع المنحني $(C_g)$ مع حاملي محوري الإحداثيات. $(0;2)$ ، $(2;0)$ ، $(-1;0)$	

1	$2 \times 0.5$	<p style="text-align: right;">التحقق أن: <math>y = 3x + 2</math> معادلة لـ <math>(T)</math>  <math>y = 3x + 2</math> و منه <math>y = g'(0)(x - 0) + g(0)</math></p> <p style="text-align: right;"><math>g(2) = 0</math> ، <math>g(-2) = 4</math></p>	4
2 $\times 0.25$	0.5	 <p style="text-align: right;">رسم <math>(T)</math>  <math>(C_g)</math></p>	5

ملاحظة: ثقيل وثراوى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقىد التام بسلم التنقيط