










العلامة مجموع مجاًة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
	التمرين الأول: (07 نقاط) -I
01,50	<p>(1) أ- حساب الكتلة المولية للفحم الهيدروجيني A :</p> $d = \frac{M_A}{29} \Rightarrow M_A = 29 \times d = 29 \times 2,414 \quad \boxed{M_A = 70 \text{ g.mol}^{-1}}$ <p>ب- إيجاد الصيغة المجملة للفحم الهيدروجيني A :</p> $A : C_x H_y \quad M_A = 70 \text{ g.mol}^{-1}$ $C\% = 85,71\%$ $H\% = 100\% - 85,71\% = 14,29\%$ $\frac{12x}{85,71\%} = \frac{y}{14,29\%} = \frac{M_A}{100\%}$ $x = \frac{70 \times 85,71}{12 \times 100} = \boxed{5} \quad y = \frac{70 \times 14,29}{1 \times 100} = \boxed{10}$ <p>الصيغة المجملة لـ A : C_5H_{10}</p> <p>(2)</p> <p>أ- الصيغ نصف المفصلة للمركبات I ، H ، G ، F ، E ، D ، C ، B ، A :</p> <p>(A) </p> <p>(B) </p> <p>(C) </p> <p>(D) </p> <p>(E) </p> <p>(F) </p> <p>(G) </p> <p>(H) </p> <p>(I) </p> <p>ب- مردود التفاعل (8): هو 67%</p>
02,50	0,25


00,50	0,50	<p>(1) المركب (J) لا تتأكسد وظيفته الكحولية لأنه كحول ثالثي (او الكربون الوظيفي لا يحتوي على هيدروجين) .</p> <p>(2) الصيغة نصف المفصلة للمركبات K ، L ، M : $M \text{, } L \text{, } K$</p>
01,50	3 x 0,50	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ <p>(K)</p> $\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{C}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ <p>(L)</p> $\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{C}-\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ <p>(M)</p>
01,00	0,50	<p>أ- معادلة تفاعل البلمرة:</p> $n \text{CH}_2=\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{CH}_3 \longrightarrow \left[\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}}} \right]_n$ <p>ب- مقطع من البوليمر (P) يتكون من 4 وحدات بنائية:</p> $\cdots \cdots -\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\cdots \cdots$
02,75	0,25	<p>التمرين الثاني: (07 نقاط)</p> <p>أ- حساب الكتلة المولية للحمض الدهني A :</p> $\left. \begin{array}{l} M_A \longrightarrow M_{\text{KOH}} \times 10^3 \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_a \end{array} \right\} \Rightarrow M_A = \frac{1 \times M_{\text{KOH}} \times 10^3}{I_a}$ $M_A = \frac{56 \times 10^3 \times 1}{184,21} \quad \boxed{M_A = 304 \text{ g.mol}^{-1}}$ <p>ب- الصيغة المجملة للحمض الدهني A :</p> $\left. \begin{array}{l} M_A \longrightarrow n M_{I_2} \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_i \end{array} \right\} \Rightarrow n = \frac{M_A \times I_i}{M_{I_2} \times 100}$ $n = \frac{304 \times 334,21}{254 \times 100} \Rightarrow \boxed{n=4}$

		عدد الروابط المضاعفة هو 4 ومنه الصيغة العامة للحمض تكون من الشكل: $C_nH_{2n-8}O_2$
0,25		$M_A = 14n - 8 + 32 = 304 \Rightarrow n = 20$
0,25		الصيغة المجملة للحمض الدهني A هي $C_{20}H_{32}O_2$ هي - الصيغة نصف المفصلة للحمض B :
0,25		$M_B = M(C_nH_{2n}O_2) = 14n + 32 = 116 \text{ g.mol}^{-1}$
0,25		$n = \frac{116 - 32}{14} = 6$
0,25		ومنه الصيغة نصف المفصلة للحمض B :
0,25		$\text{CH}_3\left(\text{CH}_2\right)_4\text{COOH}$ - الصيغة نصف المفصلة للحمض D :
0,25		D: $\text{HOOC}\left(\text{CH}_2\right)_x\text{COOH}$
0,25		$\frac{4 \times 16}{48,48} = \frac{M_D}{100} \quad \left. \Rightarrow M_D = \frac{4 \times 16 \times 100}{48,48} \quad [M_D = 132 \text{ g.mol}^{-1}] \right.$
0,25		$132 = 45 + 14x + 45 \Rightarrow 14x = 42 \Rightarrow [x = 3]$
		ملاحظة: تقبل الإجابة $20 = 6 + 9 + n \Rightarrow n = 5$
0,25		الصيغة نصف المفصلة للحمض D :
0,25		$\text{HOOC}\left(\text{CH}_2\right)_3\text{COOH}$
0,25		ج- الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A :
0,25		A: $\text{CH}_3\left(\text{CH}_2\right)_4\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}\left(\text{CH}_2\right)_3\text{COOH}$ $\text{CH}_3\left(\text{CH}_2\right)_3\left(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}\right)\left(\text{CH}_2\right)_3\text{COOH}$ وأ
01,00	0,25	أ- حساب عدد الروابط المضاعفة الموجودة في TG (2)
0,25		$M_{TG} \longrightarrow n M_{I_2}$
0,25		$100 \text{ g} \longrightarrow I_i$
0,25		$854 \text{ g.mol}^{-1} \longrightarrow n \times 254 \text{ g.mol}^{-1}$ } $100 \text{ g} \longrightarrow I_i$ } $n = \frac{854 \times 118,97}{254 \times 100} \Rightarrow [n = 4]$

		بـ- كتابة الصيغ نصف المفصلة الممكنة لـ TG :
	0,25	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_3\left(\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\right)_4\left(\text{CH}_2\right)_3\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_{14}\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_{14}\text{CH}_3 \end{array}$
	0,25	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_{14}\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_3\left(\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\right)_4\left(\text{CH}_2\right)_3\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_{14}\text{CH}_3 \end{array}$
		-II
		(1) الصيغة نصف المفصلة لكل من Asp و Phe :
00,50	2 x 0,25	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\underset{\substack{ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH}}}{\text{CH}}-\text{COOH} & \text{H}_2\text{N}-\underset{\substack{ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{Phe}}}{\text{CH}}-\text{COOH} \\ \text{Asp} & \text{Phe} \end{array}$
00,50	0,50	(2) الأسبارتام يعطي نتيجة إيجابية مع كاشف كزانتو بروتبيك لاحتوائه على حمض أميني . Phe عطري
		(3) تمثيل المماكمات الضوئية للحمض الأميني Phe حسب إسقاط فيشر :
00,50	2 x 0,25	$\begin{array}{c c} \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} & \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}-\text{CH}_2-\text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \end{array}$
01,75	0,25	أـ- استنتاج قيمة $pH_i(\text{Phe})$:
		(4)
		La بياجر عند $pH=5,48$ كونه أيون متعدد كهربائياً و منه $pH_i(\text{Phe})=5,48$

		<p>ب - حساب قيمة pK_{a_2} للفنيل ألانين و pH_i لحمض الأسبارتيك :</p> $pH_i = \frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2} \Rightarrow pK_{a_2} = 2pH_i - pK_{a_1}$ $pK_{a_2} = 2(5,48) - 1,83 \quad [pK_{a_2} = 9,13]$
	0,25	$pH_i = \frac{pK_{a_1} + pK_{a_R}}{2}$ $pH_i = \frac{1,88 + 3,66}{2} \quad [pH_i = 2,77]$
	0,25	<p>حمض أميني حامضي Asp</p>
	0,25	$pH_i = \frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2}$
	0,25	$pH_i = \frac{1,88 + 3,66}{2} \quad [pH_i = 2,77]$
		<p>ج - الصيغتين الأيونيتين للحمض الأميني Asp عند $pH=9,60$ أي عند $25^\circ C$:</p>
	2x0,25	$\begin{array}{c} H_3N^+—CH—COO^- \\ \\ CH_2 \\ \\ COO^- \end{array}, \quad \begin{array}{c} H_2N—CH—COO^- \\ \\ CH_2 \\ \\ COO^- \end{array}$
		<p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p>
		<p>-I إيجاد قيمة التغير في الطاقة الداخلية ΔU عند $25^\circ C$:</p>
01,00	0,50	$HCl_{(g)} + \frac{1}{4} O_{2(g)} \longrightarrow \frac{1}{2} Cl_{2(g)} + \frac{1}{2} H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H_r^\circ = -51 \text{ kJ.mol}^{-1}$ $\Delta H_r^\circ = \Delta U + \Delta n_g RT \Rightarrow \Delta U = \Delta H_r^\circ - \Delta n_g RT, \quad T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$
	0,25	$\Delta n_g = \frac{1}{2} - \left(1 + \frac{1}{4} \right) = -0,75$
	0,25	$\Delta U = -51 - [(-0,75) \times 8,314 \times 298 \times 10^{-3}]$
	0,25	$\boxed{\Delta U = -49,14 \text{ kJ.mol}^{-1}}$
		<p>: $\Delta H_f^\circ(HCl_{(g)})$ (2)</p>
01,00	0,50	$HCl_{(g)} + \frac{1}{4} O_{2(g)} \longrightarrow \frac{1}{2} Cl_{2(g)} + \frac{1}{2} H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H_r^\circ = -51 \text{ kJ.mol}^{-1}$ $\Delta H_r^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{products}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{réactifs})$ $\Delta H_r^\circ = \left[\frac{1}{2} \Delta H_f^\circ(Cl_{2(g)}) + \frac{1}{2} \Delta H_f^\circ(H_2O_{(\ell)}) \right] - \left[\Delta H_f^\circ(HCl_{(g)}) + \frac{1}{4} \Delta H_f^\circ(O_{2(g)}) \right]$ $-51 = \left[\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(-286) \right] - \left[\Delta H_f^\circ(HCl_{(g)}) + \frac{1}{4}(0) \right]$ $\Delta H_f^\circ(HCl_{(g)}) = 51 - 143$ $\boxed{\Delta H_f^\circ(HCl_{(g)}) = -92 \text{ kJ.mol}^{-1}}$

أ- إكمال المخطط: (3)



ب- حساب أنطالبي التبخر للماء : 25°C عند $\Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)})$

$$\Delta H_r^\circ = E_{\text{H-Cl}} + \frac{1}{4} E_{\text{O=O}} - \frac{1}{2} E_{\text{Cl-Cl}} - E_{\text{O-H}} - \frac{1}{2} \Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)})$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) = 2 \left[E_{\text{H-Cl}} + \frac{1}{4} E_{\text{O=O}} - \frac{1}{2} E_{\text{Cl-Cl}} - E_{\text{O-H}} - \Delta H_r^\circ \right]$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) = 2 \left[431 + \frac{1}{4}(498) - \frac{1}{2}(243) - 463 - (-51) \right]$$

$$\boxed{\Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) = 44 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

(4) حساب الأنطالبي ΔH_r° عند 120°C

هناك تغير في الحالة الفيزيائية للماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية

$$T_0 = 25 + 273 = 298\text{K}, T_1 = 100 + 273 = 373\text{K}, T_2 = 120 + 273 = 393\text{K}$$

$$\Delta H_{T_2}^\circ = \Delta H_{T_0}^\circ + \int_{T_0}^{T_1} \Delta C_p dT + \frac{1}{2} \Delta H_{\text{vap}}^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT$$

$$\Delta C_p = \left[\frac{1}{2} C_p (\text{Cl}_{2(\text{g})}) + \frac{1}{2} C_p (\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) \right] - \left[C_p (\text{HCl}_{(\text{g})}) + \frac{1}{4} C_p (\text{O}_{2(\text{g})}) \right]$$

$$\Delta C_p = \left[\frac{1}{2}(33,91) + \frac{1}{2}(75,29) \right] - \left[(29,12) + \frac{1}{4}(29,36) \right]$$

$$\boxed{\Delta C_p = 18,14 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}}$$

$$\Delta C_p = \left[\frac{1}{2} C_p (\text{Cl}_{2(\text{g})}) + \frac{1}{2} C_p (\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}) \right] - \left[C_p (\text{HCl}_{(\text{g})}) + \frac{1}{4} C_p (\text{O}_{2(\text{g})}) \right]$$

$$\Delta C_p = \left[\frac{1}{2}(33,91) + \frac{1}{2}(33,58) \right] - \left[(29,12) + \frac{1}{4}(29,36) \right]$$

$$\boxed{\Delta C_p = -2,715 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}}$$

		$\Delta H_{393}^{\circ} = \Delta H_{298}^{\circ} + \int_{298}^{373} \Delta Cp_1 dT + \frac{1}{2} \Delta H_{vap}^{\circ} (H_2O_{(\ell)}) + \int_{373}^{393} \Delta Cp_2 dT$
	0,25	$\Delta H_{393}^{\circ} = \Delta H_{298}^{\circ} + \Delta Cp_1 (T_1 - T_0) + \frac{1}{2} \Delta H_{vap}^{\circ} (H_2O_{(\ell)}) + \Delta Cp_2 (T_2 - T_1)$
	0,50	$\Delta H_{393}^{\circ} = -51000 + 18,14(373 - 298) + \frac{1}{2}(40700) - 2,715(393 - 373)$
	0,50	$\Delta H_{393}^{\circ} = -51000 + 1360,5 + 20350 - 54,3 = \boxed{-29343,8 \text{ J.mol}^{-1}}$
		$\boxed{\Delta H_{393}^{\circ} = -29,34 \text{ kJ.mol}^{-1}}$



العلامة مجموع مجازة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
		التمرين الأول: (7 نقاط) أ- حساب الكتلة المولية للمونومير M_1
01,75	0,25	$\text{HOOC-(CH}_2\text{)}_n\text{-COOH} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaOOC-(CH}_2\text{)}_n\text{-COONa} + 2\text{H}_2\text{O}$
	0,50	$1\text{mol}(M_1) \longrightarrow 2\text{mol(NaOH)}$ $M(M_1) \longrightarrow 2 \times M(\text{NaOH})$
	0,25	$0,73\text{g} \longrightarrow 0,5 \times 20 \times 10^{-3} \times 40 \Rightarrow M(M_1) = \frac{0,73\text{g} \times 2 \times M(\text{NaOH})}{0,5 \times 20 \times 10^{-3} \times 40}$ $M(M_1) = 146\text{g.mol}^{-1}$
		طريقة أخرى: $n(\text{NaOH}) = 2n(M_1) \Rightarrow n(M_1) = \frac{n(\text{NaOH})}{2} = \frac{C \times V}{2} = \frac{0,5 \times 20 \times 10^{-3}}{2} = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $M(M_1) = \frac{m}{n(M_1)} = \frac{0,73}{5 \times 10^{-3}} = 146\text{g.mol}^{-1}$
4,25	0,25	ب- استنتاج الصيغة نصف المفضلة للمونومير M_1 :
	0,50	لدينا: $\text{HOOC-(CH}_2\text{)}_n\text{-COOH}$ $M(M_1) = 14n + 90 = 146 \Rightarrow n = \frac{146 - 90}{14} = 4$, $\text{HOOC-(CH}_2\text{)}_4\text{-COOH}$
	0,50	أ- استنتاج صيغة المونومير M_2 : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{OH}$
	5x0,50	ب- إيجاد الصيغ نصف المفضلة للمركبات: A: B: C: D: E:
	0,50	ج- نوع البلمرة في التفاعل رقم 6: بلمرة بالتكافف

د - حساب درجة البلمرة :

$$M_{\text{motif}} = 14 \times 12 + 16 + 4 \times 16 = 248 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$n = \frac{M_p}{M_{\text{motif}}} = \frac{248000}{248} = 1000$$



(3) كتابة معادلتي التفاعلين:



01,00

0,50

ملاحظة: قبل الإجابة التالية



التمرين الثاني: (06 نقاط)

-I


أ - إيجاد الصيغة نصف المفضلة للحمض (B) :

01,25

0,25

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ mol B} \longrightarrow 1 \text{ mol KOH} \\ M_B (\text{g / mol}) \longrightarrow 56 (\text{g / mol}) \\ 2,6 \text{ g} \longrightarrow 1,12 \text{ g} \end{array} \right\} \Rightarrow M_B = \frac{2,6 \times 56}{1,12} = 130 \text{ g.mol}^{-1}$$

0,25




0,25

$$15 + 14n + 45 = 130 \Rightarrow n = \frac{130 - 60}{14} = 5$$

0,25



ب - استنتاج الصيغة نصف المفضلة للحمض الدهني (A) :



أ - إيجاد عدد الروابط المضاعفة الموجودة في الغليسيريد (G) :



01,75

0,50

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ mol G} \longrightarrow x \text{ mol I}_2 \\ 0,1 \text{ mol} \longrightarrow \frac{25,4}{254} \text{ mol} \end{array} \right\} \Rightarrow x = 1$$

توجد رابطة مزدوجة واحدة في الغليسيريد (G).

بـ- بما أن الغليسيريد يحتوي على رابطة مزدوجة واحدة فإنه أحدى الغليسيريد والصيغ نصف المفضلة الممكنة له هي:



جـ- حساب قرينة اليود للغليسيريد (G) :

0,25

$$M_G = 19 \times 12 + 36 + 4 \times 16 = 328 \text{ g.mol}^{-1}$$

0,50

$$\left. \begin{array}{l} M_G \longrightarrow 254 \\ 328 \longrightarrow 254 \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_i \end{array} \right\} \Rightarrow I_i = \frac{254 \times 100}{328} = 77,44$$


ملاحظة: طريقة أخرى لحساب M_G


$$M_G + M_{H_2O} = M_{\text{glycérol}} + M_A$$

$$M_G = 92 + 254 - 18 = 328 \text{ g.mol}^{-1}$$

-II

(1) صيغة ثلاثي البيبيتيد عند $pH=13$



		(2) كتابة صيغ الأحماض الأمينية المكونة للبيتيد:
00,75	3x0,25	$\text{H}_2\text{N}-\underset{\substack{ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{COOH}}}{\text{CH}}-\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$, $\text{H}_2\text{N}-\underset{\substack{ \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{HN}=\text{C} \\ \\ \text{NH}_2}}{\text{CH}}-\text{COOH}$ Glu Gly Arg
01,75		أ - كتابة الصيغ الأيونية لـ Arg عند تغير قيمة pH من 1 إلى 13 
	4x0,25	ب - حساب قيمة pH _i لـ Arg : $\text{pH}_i(\text{Arg}) = \frac{\text{pKa}_2 + \text{pKa}_R}{2} = \frac{9,04 + 12,48}{2} = 10,76$ ج - الصيغة السائدة لـ Arg عند pH=12 هي: $\text{H}_2\text{N}-\underset{\substack{ \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{H}_2\text{N}^+=\text{C} \\ \\ \text{NH}_2}}{\text{CH}}-\text{COO}^-$
	0,25	

التمرين الثالث : (7 نقاط)

(1 - I) حساب كمية الحرارة Q_{fus} و Q_1

$$Q_1 = m_2 c_g \Delta T = m_2 c_g (273 - T_2) = 10 \times 2,03 (273 - 271) = 40,6 \text{ J}$$

$$Q_{\text{fus}} = m_2 L_{\text{f(glace)}}$$

$$Q_{\text{fus}} = 10 \times 334,45 = 3344,5 \text{ J}$$

(2) حساب درجة حرارة التوازن T_{eq}

$$Q_2 = m_2 c_e (T_{\text{eq}} - 273) = 10 \times 4,185 T_{\text{eq}} - 10 \times 4,185 \times 273 = 41,85 T_{\text{eq}} - 11425,05$$

$$Q_3 = (C_{\text{cal}} + m_1 c_e)(T_{\text{eq}} - T_1) = (200 + 200 \times 4,185)T_{\text{eq}} - (200 + 200 \times 4,185)T_1 \\ = 1037 T_{\text{eq}} - 1037 \times 303 = 1037 T_{\text{eq}} - 314211$$

$$\sum Q = 0$$


$$Q_1 + Q_{\text{fus}} + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$40,6 + 3344,5 + 41,85 T_{\text{eq}} - 11425,05 + 1037 T_{\text{eq}} - 314211 = 0$$

$$1078,85 T_{\text{eq}} - 322250,95 = 0 \Rightarrow T_{\text{eq}} = \frac{322250,95}{1078,85} = 298,7 \text{ K} = 25,7^\circ\text{C}$$

-II

أ - إكمال المخطط: (1)



ب - حساب أنطالبي تشكيل بروبيل أمين السائل (1)

$$\begin{aligned}
 \Delta H_f^\circ(C_3H_7-NH_{2(\ell)}) &= 3\Delta H_{\text{sub}}^\circ(C) + \frac{9}{2}E_{(H-H)} + \frac{1}{2}E_{(N=N)} - 2E_{(C-C)} - E_{(C-N)} \\
 &\quad - 2E_{(N-H)} - 7E_{(C-H)} - \Delta H_{\text{vap}}^\circ(C_3H_7-NH_2)
 \end{aligned}$$

$$\Delta H_f^\circ(C_3H_7-NH_{2(\ell)}) = 3(717) + \frac{9}{2}(436) + \frac{1}{2}(945) - 2(348) - 292 - 2(390) - 7(413) - 29,2$$

$$\boxed{\Delta H_f^\circ(C_3H_7-NH_{2(\ell)}) = -102,7 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

<p>01,25</p> <p>0,50</p> <p>$C_3H_7-NH_{2(\ell)} + \frac{21}{4} O_{2(g)} \longrightarrow 3 CO_{2(g)} + \frac{9}{2} H_2O_{(\ell)} + \frac{1}{2} N_{2(g)}$</p> <p>: $\Delta H_f^0(C_3H_7-NH_{2(\ell)})$</p> <p>$\Delta H_{\text{comb}}^\circ(C_3H_7-NH_{2(\ell)}) = \sum \Delta H_f^\circ(\text{produits}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reactifs})$</p> <p>$\Delta H_{\text{comb}}^\circ(C_3H_7-NH_{2(\ell)}) = 3\Delta H_f^\circ(CO_{2(g)}) + \frac{9}{2}\Delta H_f^\circ(H_2O_{(\ell)}) - \Delta H_f^\circ(C_3H_7-NH_{2(\ell)})$</p> <p>$= 3(-393) + \frac{9}{2}(-286) - (-102,7) - \frac{21}{4}(0)$</p> <p>$\boxed{\Delta H_{\text{comb}}^\circ(C_3H_7-NH_2)_{(\ell)} = -2363,3 \text{ kJ/mol}}$</p>	<p>أ- موازنة معادلة الاحتراق: (2)</p> <p>0,50</p> <p>0,25</p> <p>01,00</p> <p>00,50</p> <p>00,50</p>
<p>1-III</p>	
<p>(2) حساب السرعة المتوسطة : V_{moy}</p> <p>$V_{\text{moy}} = \frac{\Delta [I_2]}{\Delta t} = \frac{[I_2]_2 - [I_2]_1}{t_2 - t_1} = \frac{0,030 - 0,023}{40 - 20} = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$</p> <p>(3) إيجاد قيمة السرعة الحظية V_t عند $t=40s$</p> <p>$\text{tg} \alpha = \frac{y \times 0,005}{x \times 20} = \frac{1,6 \times 0,005}{2 \times 20}$</p> <p>$V_t = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$</p>	