

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
1	0.25 0.75	البرهان بالتراجع: التحقق من صحة الخاصية الابتدائية إثبات صحة الاستلزام (إثبات أن الخاصية وراثية)
0.5	0.25 0.25	من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{5}(u_n + 3)$ و $u_n + 3 > 0$ إذن (u_n) متناقصة تماما (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة
1.75	2 × 0.25	أ) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = \frac{3}{5}v_n$ ، $v_0 = 5$
	0.5	ب) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n$
	0.5	من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n - 3$
	0.25	ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -3$ لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$
0.75	2 × 0.25 0.25	من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{25}{2} \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} \right]$ $T_n = S_n - 3(n+1) = \frac{19}{2} - 3n - \frac{15}{2} \left(\frac{3}{5}\right)^n$
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1.75	4x0.25	أ) $\Delta = 121$ ، مجموعة حلول المعادلة هي : $\left\{ -1 ; \frac{1}{10} ; 1 \right\}$
	0.75	ب) من أجل كل عدد حقيقي x ، $10x^2 + 9x - 1 = (x+1)(10x-1)$
1.5	3x0.25	أ) مجموعة حلول المعادلة هي : $\left\{ e^{-1} ; e^{\frac{1}{10}} ; e^1 \right\}$
	0.25	ب) $(1 - e^x)(e^x + 1)(10e^x - 1) \leq 0$ تكافئ $(1 - e^x)(10e^{2x} + 9e^x - 1) \leq 0$
	0.25	إشارة $(1 - e^x)(10e^x - 1)$
	0.25	مجموعة الحلول هي $]-\infty; -\ln 10] \cup [0; +\infty[$


0.75	0.25	$10x^2 + 9x - 1 \geq 0$ تكافئ $\ln(10x^2 + 9x) \geq 0$ إشارة $10x^2 + 9x - 1$ من أجل x حقيقي موجب تماما مجموعة الحلول هي $\left[\frac{1}{10}; +\infty\right[$	3
	0.25		
	0.25		
التمرين الثالث (04 نقاط)			
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : (ب)	1
	0.5	تبرير : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = u_{n-1} + nr$ ، $u_n = 3 - 4n$	
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : (أ)	2
	0.5	تبرير : $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ ومنه $y = x + 1$	
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : (ج)	3
	0.5	تبرير : عبارة الدالة الاصلية للدالة g التي تتعدم عند القيمة 1 هي $G(x) = x^2 - \ln x - 1$	
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : (أ)	4
	0.5	تبرير : $\frac{1}{1-0} \int_0^1 3(x+1)^2 dx = \left[(x+1)^3 \right]_0^1 = 7$	
التمرين الرابع (08 نقاط)			
0.5	0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3}{e^x + 1}\right) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	1
1	0.5	(أ) المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x+1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3}{e^x + 1}\right) = 0$	2
	0.25	(ب) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $\frac{-3}{e^x + 1} < 0$ ،	
	0.25	(C_f) يقع أسفل (Δ)	

3	1	أ) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $f'(x) = 1 + \frac{3e^x}{(e^x + 1)^2}$	3									
	1	ب) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $f'(x) > 0$ ، الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ جدول التغيرات										
	1	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\frac{1}{2}$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </tbody> </table>	x	0	$+\infty$	$f'(x)$		+	$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	
x	0	$+\infty$										
$f'(x)$		+										
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$										
1	1	المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,28 < \alpha < 0,29$ لأن : الدالة f مستمرة ومنتزعة تماما على $[0,28 ; 0,29]$ و $f(0,29) \times f(0,28) < 0$ و $(f(0,29) \approx 0,006 , f(0,28) \approx -0,001)$	4									
1	0.25 0.75		5									
1.5	1	أ) F تقبل الاشتقاق على $[0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty[$ ، $F'(x) = \frac{3}{e^x + 1}$	6									
	2×0.25	ب) حساب المساحة $\int_0^{\ln 2} (x+1-f(x)) dx = [F(x)]_0^{\ln 2} = 4 \ln\left(\frac{64}{27}\right) cm^2$										

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
1	0.25 0.75	1 البرهان بالتراجع: التحقق من صحة الخاصية الابتدائية إثبات صحة الاستلزام (إثبات أنّ الخاصية وراثية)
0.5	0.25 0.25	2 من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{4}(u_n - 4)$ و $u_n - 4 < 0$ إذن (u_n) متزايدة تماما (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى وبالتالي فهي متقاربة
1.75	2×0.25 0.5 0.5 0.25	3 (أ) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$ و $v_0 = -2$ (ب) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$ من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$ (ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ لأن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$
0.75	0.5 0.25	4 من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $S_n = -\frac{8}{3}\left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right]$ من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $T_n = S_n + 4(n+1) = 4n + \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	0.5 0.5	1 الاقتراح الصحيح هو : (أ) تبرير : $e^{2x} + 4e^x - 5 = 0$ تكافئ $(e^x + 5)(e^x - 1) = 0$ ومنه : $x = 0$
1	0.5 0.5	2 الاقتراح الصحيح هو : (ج) تبرير : $\alpha = 5\alpha - 4$ تكافئ $\alpha = 1$
1	0.5 0.5	3 الاقتراح الصحيح هو : (ب) تبرير : من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $F'(x) = f(x)$ و $F(0) = 0$

1	0.5	الإقتراح الصحيح هو : أ)	4
	0.5	تبرير : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1-e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{e^x}{x}\right) = -\infty$	
التمرين الثالث (04 نقاط)			
2	1	أ) من أجل كل عدد حقيقي x ، $(x-2)(x^2-4x+3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$	1
	4x0.25	ب) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ تكافئ $(x-2)(x^2-4x+3) = 0$ ، $\Delta = 4$ ، مجموعة الحلول هي : $\{1; 2; 3\}$	
1.5	3x0.25	أ) مجموعة الحلول هي : $\{e^1; e^2; e^3\}$	2
	3x0.25	ب) $e^{3x} - 6e^{2x} + 11e^x - 6 = 0$ تكافئ $(e^x-1)(e^x-2)(e^x-3) = 0$ ، مجموعة الحلول هي $\{0; \ln 2; \ln 3\}$	
0.5	0.25	أ) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \geq 0$ تكافئ $\ln(x^3 - 6x^2 + 11x - 5) \geq 0$	3
	0.25	إشارة $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ من أجل x حقيقي من المجال $]2; +\infty[$ مجموعة الحلول هي $[3; +\infty[$	
التمرين الرابع (08 نقاط)			
1.75	0.75	أ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$	1
	0.25	المنحني (C_f) يقبل المستقيم ذا المعادلة $x=0$ مقاربا له	
	0.75	ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(x-1 - \frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$	
2	1	أ) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{(2x+1)(x-1)}{x}$	2
	0.5	ب) إشارة $f'(x)$	
2.75	0.5	الدالة f متناقصة تماما على $]0; 1]$ ومنتزدة تماما على $[1; +\infty[$	جدول التغيرات
	0.75	جدول التغيرات	

1	2×0.5	معادلة لـ (T) هي: $y = f'(2)(x-2) + f(2) = \frac{5}{2}x - 3 - \ln 2$	3
1	0.25 0.25 0.5	<p data-bbox="1244 331 1452 380">$f(3) = 6 - \ln 3$</p>  <p data-bbox="1340 448 1468 504">رسم (T)</p> <p data-bbox="1308 560 1468 627">رسم (C_f)</p>	4
1.5	1 2×0.25	<p data-bbox="462 1321 1468 1377">أ) F تقبل الاشتقاق على $]0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$ ،</p> <p data-bbox="1085 1377 1436 1433">$F'(x) = x^2 - x - \ln x$</p> <p data-bbox="798 1444 1468 1545">ب) $\int_1^3 f(x) dx = [F(x)]_1^3 = \left(\frac{20}{3} - 3\ln 3\right) u.a$</p>	5

ملاحظة: تُقبل و تُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط