

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية ميلة

دورة : ماي 2018

امتحان البكالوريا التجريبية للتعليم الثانوي

الشعبة : تقني رياضي

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

التمرين الأول : (4 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

نعتبر النقط A, B, C, D التي لواحقها على الترتيب ، $z_B = z_A e^{i\frac{\pi}{2}}$ ، $z_C = -z_A$ ، $z_A = 2 - 2i$ و $z_D = 2 - 6i$.

(1) أكتب كل من الأعداد z_A, z_B, z_C و z على الشكل الأسوي ، و بين أن $z_A^{2018} + z_C^{2018} = 0$.

(2) أ) علم النقط A, B, C و D .

ب) بين أن النقطة D هي صورة النقطة C بالدوران الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

ج) ما طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟ مع التعليل.

(3) α عدد حقيقي غير معروف ، نسمي النقطة G_α مرجح الجملة المتقلقة : $\{(A,1); (B,-1); (C,\alpha)\}$

أ) بين أن $\overrightarrow{CG_\alpha} = \frac{1}{\alpha} \overrightarrow{BA}$ ، استنتج طبيعة المجموعة (Δ) مجموعه النقط G_α عندما يمسح α مجموعه الأعداد الحقيقية الغير معروفة ، ثم أنشئ (Δ) .

ب) عين قيمة α لكي تتطابق النقطة G_α على النقطة D .

(4) أ) عين لاحقة النقطة G_2 مرجح الجملة المتقلقة $\{(A,1); (B,-1); (C,2)\}$.

ب) حدد طبيعة (Γ) مجموعه النقط M من المستوى حيث $\left\| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right\| = 4\sqrt{2}$ وعناصرها المميزة و أنشئها.

التمرين الثاني : (5 نقاط)

نعتبر المعادلة (1) ذات المجهول $(x; y)$: $2688x + 3024y = -3360$ حيث x و y عداد صحيحان .

(1) أ) عين القاسم المشترك الأكبر للعددين 2688 و 3024.

ب) استنتاج أن المعادلة (1) تكافئ المعادلة (2) : $8x + 9y = -10$.

(2) حل المعادلة (2) اذا علمت أن الثانية $(1, -2)$ حل خاصا لها

(3) عين الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (2) بحيث $x^2 \equiv y + 3 [5]$ حيث

(4) في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(2, -2, 0)$ ، $B(0, 1, 4)$ و $C(1, 0, 3)$

ونعتبر المستوى (P_1) المعرف بالمعادلة $3x - y + 5z = 0$

- أ) بين أن النقط A ، B و C تعيين مستويات (P_2) حيث $x + 2y - z + 2 = 0$ معادلة ديكارتية له .
- ب) اثبت أن المستويات (P_1) و (P_2) متقاطعان .
- ج) ليكن (Δ) مستقيم تقاطع المستويات (P_1) و (P_2) .
- أثبت أن إحداثيات نقط المستقيم (Δ) تحقق المعادلة (2) .

التمرين الثالث : (4 نقاط)

نعتبر المتالية (u_n) المعرفة كما يلي : $u_0 = -3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 3n - 1$.

(1) أحسب u_1 ، u_2 و u_3

ب) بين بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 3$: $u_n > 0$.

ج) أستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$: $u_n > 3n - 4$ ، ثم استنتج نهاية المتالية (u_n) .

(2) نعرف المتالية (v_n) من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي : $v_n = u_n - 9n + 30$

أ) برهن أن (v_n) متالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدتها الأول v_0

ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = 27\left(\frac{2}{3}\right)^n + 9n - 30$

(3) أحسب بدلالة n الجداء ،

ب) احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

التمرين الرابع : (7 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[1, +\infty)$ كما يلي :
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

(1) أحسب $f(x) = x + 1 + \ln\left(\frac{x+1}{x+2}\right)$ ، و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. لاحظ أن $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$

(2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[1, +\infty)$.

ب) أستنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) أ) بين $1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ ثم أستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب كتابة معادلة له .

ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(4) بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0 < \alpha < 0.5$

(5) أرسم (Δ) و (C_f) .

(6) أ) λ عدد حقيقي ، بين أن الدالة $x \mapsto \ln(x - \lambda)$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x - \lambda)$ على المجال $[\lambda, +\infty)$

ب) أحسب العدد $S = \int_0^1 (x+1 - f(x)) dx$ ، وفسر بيانيا النتيجة .

(7) لتكن الدالة العددية h المعرفة على المجال $[1, +\infty)$ كما يلي :

أدرس تغيرات الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها (دون تعين عباره $h(x)$)

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (4 نقط)

صندوق به ثلاثة كرات خضراء تحمل الرقم 0، كرتان حمراء تحملان الرقم 5 وكرة واحدة بيضاء تحمل العدد α (عدد طبيعي غير معروف يختلف عن 5 و10)، كل الكرات لا تميز بينها عند اللمس.
يسحب لاعب ثلاثة كرات في آن واحد

(I) احسب احتمال الحوادث التالية :

"A" اللاعب يسحب ثلاثة كرات من نفس اللون "

"B" اللاعب يسحب ثلاثة كرات من ألوان مختلفة "

"C" اللاعب يسحب كرتين فقط من نفس اللون "

(II) اللاعب يربح بالدينار مجموع الأرقام المسجلة على الكرات المسحوبة .

نعرف المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب ثلاثة كرات الربح بالدينار الذي يتحصل عليه اللاعب

$$P(X = \alpha) = \frac{3}{20}$$

(2) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(3) أحسب بدلالة α الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي، وعين قيمة العدد α حتى يربح اللاعب 20 دينارا.

التمرين الثاني: (5 نقاط)

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة : $0 = z^2 - 6z + 13$

(II) المستوى المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتاجنس. $\left(O; \vec{u}, \vec{v} \right)$

نعتبر النقط A, B, C و D التي لواحقها $z_A = i$ ، $z_B = 2$ ، $z_C = 3+2i$ و $z_D = \overline{z_C}$ على الترتيب.

(1) أ) علم النقط A, B, C و D

ب) حدد الكتابة المركبة للتشابه المباشر الذي مركزه A ويتحول B إلى C .

ج) بين أن $i = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

د) برهن أن النقطة B هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ADC

(2) S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث $z' = (1+i)z + 1$

أ) عين طبيعة التحويل S وعناصره المميزة ، ثم عين لاحقة صورة النقطة B بالتحويل S .

ب) عين (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث $z = 2 + \sqrt{5}e^{i\theta}$ و $\theta \in \mathbb{R}$.

ج) برهن أن $(z - z_B)(z - z_C) = (1+i)(z - z')$

د) استنتاج انه اذا كانت M نقطة من المجموعة (E) فإن M' تنتهي إلى دائرة (H) يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها ثم أنشئ كل من (E) و (H) في نفس المعلم السابق .

التمرين الثالث: (4 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[1, +\infty]$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$ تمثيلها البياني المعطى في الشكل

(1) أدرس اتجاه تغيرات الدالة f على المجال $[1, +\infty]$

(ب) أستنتج أنه إذا كان: $x \in [1, 2]$ فإن $f(x) \in [1, 2]$

(2) (المتالية العددية المعرفة بحدها الأول u_0) ومن أجل كل عدد طبيعي n ،

- أعد رسم الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0, u_1 و u_2 مبرزا خطوط التمثيل، ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغيرات (u_n) وتقاربها.

(3) (أ) برهن بالتراجع أن: من أجل كل عدد طبيعي n :

(ب) بين أن المتالية (u_n) متناقصة تماما.

(ج) استنتاج أن المتالية (u_n) متقاربة وحدد نهايتها.

(4) (أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $0 < u_{n+1} - 1 \leq \frac{1}{3}(u_n - 1)$

(ب) أستنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $0 < u_n - 1 \leq \frac{1}{3^n}$

(ج) نضع : $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$

. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معروف n فإن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n \leq n + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)$

التمرين الرابع: (7 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقة \mathbb{R} كما يلي:

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة g

(2) أستنتاج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقة \mathbb{R} كما يلي:

. ولتكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (j, i) .

(1) (أ) بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ، وأحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(ب) بين أن من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$ ، ثم أدرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها.

(ج) استنتاج أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف يطلب تعين إحداثياتها.

(2) (أ) بين أن المستقيم (Δ) المعرف بالمعادلة $y = x$ مقارب مائلاً للمنحنى (C_f) .

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(3) مستقيم معادلته $y = x + e$ ، بين أن المستقيم (T) مماس للمنحنى (C_f) في نقطة يطلب تحديدها.

(4) (أ) بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0.8 < \alpha < 0.9$.

(ب) أحسب $f(-1.5)$ ثم أرسم (T) ، (Δ) والمنحنى (C_f) .

(5) ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $(x+1)e^{1-x} = |m|$.