

موقع عيون البصائر التعليمي

التدرجات السنوية
مادة الرياضيات
السنة الثانية شعبة رياضيات

المصرح التعليمي الأمثل

الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لشعبة الرياضيات

تُعتبر السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين بداية المرحلة الثانوية ونهايتها. ويفترض هذا لبرنامج أنّ التلميذ قد اكتسب، في السنة الأولى ثانوي، زادا معرفيا يؤهله لمواصلة بلورة ميله نحو الاهتمام بالمواد العلمية، ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من الكفاءات لدى هذا الصنف من التلاميذ حسب الجدول الآتي:

التحليل

16. دراسة اتجاه تغيّر دالة باستعمال دوال مرجعية.
17. تمثيل دوال انطلاقا من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.
18. التعرف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة.
19. حلّ مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.
20. حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.
21. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها.
22. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.

الهندسة

21. ممارسة الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.
22. تنمية تصور الأشكال في الفضاء.
23. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء.
24. التعرف على الأوضاع النسبية في الفضاء.
25. ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء.
26. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في المستوى وفي الفضاء.
27. حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية.
28. حلّ مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي و/أو التحويلات النقطية.

الإحصاء والاحتمالات

11. تمثيل سلسلة إحصائية بيانياً.
12. تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة مؤشرات الموقع ومؤشرات التشتت وتفسير ذلك.
13. تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة مخطط بعلبة.
14. ممارسة المحاكاة ووضع نموذج رياضي كمدخل للاحتتمالات
15. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.

تكنولوجيات الإعلام والاتصال

11. استخدام الحاسبة العلمية و/أو البيانية لبناء تعلّقات وإجراء حسابات قصد حل مشكلة.
12. استخدام البرمجيات والحاسبة العلمية و/أو البيانية للتجريب والتخمين ومقارنة نتائج والتصديق وإجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفهوم جديد (مفهوم نموذج رياضي، الاحتمال، ...)
13. توظيف البرمجيات و/أو الحاسبة البيانية لاستخراج منحنى دالة قصد استغلاله.
14. توظيف البرمجيات والحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشتت لسلسلة إحصائية أو لاستخراج تمثيلات بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة ثم استغلالها.
15. توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية قصد حلّ مسائل هندسية.

المنطق والبرهان الرياضي

1. ممارسة البرهان بمختلف أنماطه.
2. صياغة نصوص رياضية بصورة سليمة.
3. التمييز بين أنماط البرهان الذي يمارس في هذا المستوى.
4. تنمية تصور التلميذ للجانب النظري في البناء الرياضي وترسيخه لديه.

الترج السنوي لبناء التعلّات في السنة الثانية رياضي

المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لترج التعلّات
الدوال		تقويم تشخيصي ثم تدعيم المكتسبات الضرورية للوحدة	
	1. دراسة اتجاه تغير دالة باستعمال دوال مرجعية. 2. تمثيل دوال انطلاقا من تمثيلات بيانية لدوال مرجعية.	عموميات: العمليات على الدوال: $\lambda.f$ ؛ $f + g$ ؛ $f \times g$ ؛ $\frac{f}{g}$ ؛ $f \circ g$ (1)	(1) • نطلق من الدوال المدروسة في السنة الأولى. • تقترح أنشطة تتطلب كتابة الدالة التناظرية أو دالة كثير حدود من الدرجة الثانية على أشكال مختلفة حسب الهدف. • تعالج بعض الأمثلة قصد توضيح أهمية تعريف المجال I الذي تكون فيه الدالة $g \circ f$ معرفة.
		العمليات على الدوال: (تابع)	
		تفكيك دالة باستعمال الدوال المرجعية.	
		دراسة اتجاه تغير دالة باستعمال الدوال المرجعية.	
		اتجاه التغير والتمثيل البياني للدوال من الشكل: $\lambda.f$ ؛ $f + k$ و $g \circ f$ (2)	(2) • نتطرق إلى دراسة أمثلة مضادة لدوال من الشكل $f + g$ ، $f \times g$ لا يمكن إعطاء قواعد حول اتجاه تغيرها. • فيما يتعلق بالدالة $g \circ f$ نكتفي بالحالة التي يكون فيها كل من f و g رتيبتين.
		اتجاه التغير والتمثيل البياني للدوال من الشكل: $\lambda.f$ ؛ $f + k$ و $g \circ f$ (تابع)	
		تمثيل دالة بيانيا باستعمال الدوال المرجعية عندما يكون ذلك ممكنا. (3) التطرق إلى محور ومركز تناظر منحنى	(3) • نمثل بيانيا الدوال $\lambda.f$ ، $f + k$ ونوسع ذلك إلى الدوال $ f $ ، $f(x+b)$ ، $f(x+b)+k$ حيث التمثيل البياني للدالة f معلوم. • توظيف شفعية دالة أو دوريتها قصد استعمالها لاقتصار الدراسة أو لتبرير تناظر منحنى.
		حل مسائل تستخدم فيها معادلات و/أو مترجمات من الدرجة الثانية و/أو الثالثة باستعمال التحليل إلى جداء عوامل.	(4) • نعمل على أن يصبح تحديد ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية آليا عند التلميذ أثناء حلّ هذا النوع من المسائل.

	حل مسائل تستخدم فيها معادلات و/أو متراجحات من الدرجة الثانية و/أو الثالثة باستعمال التحليل إلى جداء عوامل. تابع		
الاشتقاقية	1 التعرّف على اشتقاقية دالة عند قيمة حقيقية وحساب الدالة المشتقة. 2 حلّ مسائل الاستمثال (البحث عن القيم المثلى) باستعمال المشتقات.	العدد المشتق: مقارنة المفهوم والتعريف. (5)	(5) • يمكن مقارنة العدد المشتق بعدّة طرق، ونقترح كمثال على ذلك المرور من السرعة المتوسطة إلى السرعة اللحظية في الحركات المستقيمة حيث نبدأ بتلك التي معادلاتها الزمنية للحركة من الدرجة الثانية. • لا تثار مسألة وجود العدد المشتق. • نعرّف العدد المشتق للدالة f عند x_0 بأنه النهاية للدالة: $h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ لـ h لما يؤول h إلى 0. نقول عندئذ إنّ f قابلة للاشتقاق عند x_0 ونرمز للعدد المشتق للدالة f بالرمز $f'(x_0)$.
	حساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي x_0 .		
	التفسير الهندسي للعدد المشتق: تعيين معادلة المماس. (6)	(6) • تُفسّر قابلية الاشتقاق للدالة f عند x_0 بوجود مُماس لتمثيلها البياني، معامل توجيهه هو $f'(x_0)$ ثمّ يتم إجراء التقريب الخطي لهذه الدالة بجوار القيمة x_0 بواسطة الدالة التآلفية: $f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ أي $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ في الحاسبة البيانية: نستعمل اللمسة Zoom لتوضيح ذلك.	
	التفسير الهندسي للعدد المشتق: تعيين معادلة المماس وتطبيقات. تابع		
	حساب مشتقات الدوال المألوفة $x \mapsto \sqrt{x}$ ؛ $x \mapsto \sin x$ ؛ $x \mapsto \frac{1}{x}$ ؛ $x \mapsto x^n$		

			$x \mapsto \cos x$ (7)
			حساب مشتقات الدوال المألوفة $x \mapsto \sin x$ ؛ $x \mapsto \cos x$ (7)
			(7) • نجعل التلميذ يستعمل الرمزين f' و $f'(x)$ ويميز بينهما. • نلاحظ أنّ مجموعة قابلية الاشتقاق مطابقة لمجموعة التعريف في كل أنواع الدوال المقررة في هذا المستوى ماعدا دالة الجذر التربيعي.
			قواعد حساب مشتقات الدوال: $f + g$ ؛ $f \times g$ ؛ $\frac{f}{g}$ ؛ $\frac{1}{g}$ و $x \mapsto f(ax + b)$
			المشتق واتجاه التغير: تعيين اتجاه تغير دالة. (8)
			(8) • تُختار أمثلة ندرس فيها اتجاه تغير دالة كثير حدود أو دالة ناطقة.
			استعمال المشتقة لتعيين القيم الحدية لدالة. (9)
			(9) • تُقترح أنشطة تهدف إلى استنتاج حصر دالة على مجال بثوابت أو دوال بسيطة.
			حل مسائل تستخدم فيها دوال ناطقة. (10)
			(10) • تُعالج مسائل "الاستمثال" التي نبحث فيها عن القيم المثلى التي تحقق المطلوب.
الاحتمالات	1. ممارسة المحاكاة و وضع نموذج رياضي كمدخل للاحتمالات 2. ممارسة الحساب الاحتمالي على فضاء احتمال منته.	تذكير بمحاكاة تجربة عشوائية: محاكاة تجربة عشوائية بسيطة. إبراز مفهوم ميل التواترات نحو الاستقرار من خلال أمثلة متنوعة (13)	(13) • بعد اختيار نموذج لتجربة عشوائية، يمكن محاكاتها. ويتعلق الأمر بتجارب من النوع: (إلقاء قطعة نقدية، إلقاء النرد، السحب مع الإرجاع، ...). • ندرج، من خلال أمثلة، المصطلحات: حادثة عكسية، اتحاد أو تقاطع حوادث، الحادثة الأكيدة، الحادثة المستحيلة، حادثتان منفصلتان.
		قانون الاحتمال: استمثال التواترات (التمييز بين التواتر التجريبي والتواتر النظري كمدخل لمفهوم الاحتمال)	
		وصف تجربة عشوائية بسيطة، عدد النتائج الممكنة فيها منته. (12)	(12) • نقصد بوصف تجربة عشوائية تعيين مجموعة النتائج الممكنة Ω حيث $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ ، ثم إرفاق

كل نتيجة ω_i بعدد حقيقي p_i حيث يكون $\sum p_i = 1$ و $p_i \geq 0$ أي تعيين الثنائيات $(\omega_i; p_i)$ حيث p_i هو احتمال الحادثة البسيطة $\{\omega_i\}$.		
(11) • نُشير إلى أن المدخل إلى مفهوم الاحتمال يمرّ عبر نمذجة وضعيات من خلال المقاربة التواترية، ففي تجربة إلقاء قطعة نقدية عددا كبيرا من المرات، نلاحظ أن تواتر ظهور أحد الوجهين يقترب من تواتر ظهور الوجه الآخر، مما يسمح لنا بالقول أن تواتر ظهور كل منهما يؤول نحو الاستقرار حول القيمة $\frac{1}{2}$ ؛ وبهذا نكون قد نمذجنا هذه التجربة (رمي قطعة نقدية مرة واحدة)، ثم أن القيمة $\frac{1}{2}$ هي التي نسميها فيما بعد احتمال ظهور أحد الوجهين.	قانون الاحتمال: نمذجة بعض الوضعيات البسيطة. (11)	
	حساب احتمال حادثة في تجربة عشوائية بسيطة	
	حساب الأمل الرياضي، الانحراف المعياري (والتباين) لقانون الاحتمال.	
(14) • في حالة تساوي الاحتمالات، نحسب احتمال حادثة A بالعلاقة: $\frac{\text{عدد الحالات الملائمة (لتحقق الحادثة)}}{\text{عدد الحالات الممكنة (نتائج التجربة)}}$	الاحتمالات المتساوية: حساب احتمال حادثة بسيطة وحادثة مركبة. (14)	
	حساب احتمال حادثة بسيطة وحادثة مركبة. (تابع)	
	استعمال خواص الاحتمال في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة.	
(15) • يمكن اقتراح كأول مثال للمتغير العشوائي: "الربح" الذي نتحصل عليه في لعبة "الربح والخسارة" حيث نعبر عن الربح بعدد موجب وعن الخسارة بعدد سالب.	المتغير العشوائي: تعيين قانون الاحتمال لمتغير عشوائي. (15)	
(16) • لا نكتفي بإعطاء العلاقة الرياضية التي يحسب	حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف	

		المعياري لمتغير عشوائي. (16)	بها الأمل الرياضي ولا بحسابه، بل نحرص على إعطاء معنى له من خلال ربطه بالوسط الحسابي أو بعلاقته بالوسط الحسابي المتزن.
		حل مسائل في الاحتمالات	
المُرَجَّح	1 ممارسة الحساب الشعاعي في المستوى 2 ممارسة الحساب على مُرَجَّح نقطتين و/أو ثلاث نقط واستعمال خواصه في حلّ مسائل هندسية.	إنشاء مُرَجَّح نقطتين، مُرَجَّح ثلاث نقط. (17)	(17) • توظيف نظرية طاليس في إنشاء مُرَجَّح نقطتين. • تتم دراسة المُرَجَّح في المستوي.
		استعمال خاصية التجميع في إنشاء مُرَجَّح ثلاث نقط	
		حساب إحداثيي المُرَجَّح.	
		استعمال المُرَجَّح لإثبات استقامية نقط وتلاقي مستقيمات.	
		استعمال المُرَجَّح لإثبات استقامية نقط وتلاقي مستقيمات. (تابع)	
		توظيف المُرَجَّح في دراسة مجموعات نقطية وتعيينها وإنشائها. (18)	(18) • يمكن استعمال خاصية التجميع في إنشاء مُرَجَّح ثلاث نقط أو أكثر.
		توظيف المُرَجَّح في دراسة مجموعات نقطية وتعيينها وإنشائها. تابع (19)	(19) • تقترح أمثلة يوظف فيها المُرَجَّح لدراسة مجموعات نقط وتعيينها وإنشائها.
	تقويم ومعالجة		
النهايات	حساب نهايات دالة ودراسة سلوكها التقاربي باستعمال هذه النهايات.	السلوك التقاربي لمنحنى دالة: نهاية دالة عندما x إلى x_0 أو إلى ما لا نهاية (20)	(20) • يُقتصر تطبيق تعريف النهاية، باستعمال المجالات، على أمثلة للدوال المرجعية كتفسير للمقاربة التجريبية والحدسية للمفهوم. $x \mapsto ax + b$ ، $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto \sqrt{x}$.
		- حساب نهاية دالة عندما x إلى $+\infty$ أو $-\infty$ - معرفة شرط وجود مستقيم مقارب للمنحنى يوازي	(21) • نقترح في البداية أمثلة حول حساب النهايات عندما

		محور الفواصل. (21)	$ x \rightarrow +\infty$ ثم عندما $x \rightarrow x_0$ عندما $x \rightarrow x_0$
		حساب نهاية دالة ناطقة عندما يؤول x إلى a ، حيث a حد لمجموعة تعريف هذه الدالة. التفسير البياني لنهاية غير منتهية لدالة عندما يؤول x إلى x_0 أي معرفة شرط وجود مستقيم مقارب للمنحنى يوازي محور الترتيب.	
		حساب النهايات باستعمال مبرهنات المجموع؛ الجداء؛ المقلوب؛ حاصل القسمة. (22)	(22) • يطلب تبرير قواعد حساب النهايات عند استعمال النظريات الأولية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل التلميذ، وتختار لذلك أمثلة لدوال كثيرة حدود ودوال تناظرية ودوال ناطقة أخرى.
		تبرير أن مستقيماً معلوماً هو مستقيم مقارب مائل. - البحث عن مستقيم مقارب مائل. (23)	(23) • يمكن استعمال حاسبة بيانية لتخمين وجود مستقيم مقارب بالبحث المتكرر عن معادلته (التي تكون من الشكل $y = ax + b$) ثم تبريرها فيما بعد بالحساب.
		حساب نهايات بإزالة حالة عدم التعيين. (24)	(24) • تُوضح حالات عدم التعيين بأمثلة مُختارة، ونذكر هنا بأن التركيز على تقنيات الحساب الجبري في تحويل عبارة أمر يساعد التلميذ على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترضه في إزالة حالات عدم التعيين.
		حل مسائل (25)	(25) • من خواص النهايات يمكن الرجوع إلى قواعد حساب مشتقات الدوال نجد في استخراجها فرصة يمارس فيها التلميذ البره كما يمكن إدراج الدوال غير قابلة للاشتقاق واستخراج أنصاف المماسات مائلة أو موازية لحامل محور الترتيب.
		حل مسائل (تابع)	
الزوايا الموجهة	حلّ معادلات ومتراجحات مثلثية.	الزوايا الموجهة لشعاعين: استعمال خواص الزوايا الموجهة لإثبات تقايس الزوايا. (26)	(26) • نبرهن نظرية الزاوية المحيطية.
		أقياس الزاوية الموجهة: تعيين أقياس زاوية موجهة	(27) • نتطرق في هذه الفقرة إلى الزاوية الموجهة لشعاعين

غير معدومين وإلى خواصها دون أي توسع نظري. ثم نتطرق إلى أقياس زاوية موجهة، خاصة القيس الرئيسي الذي يكون محصوراً ضمن المجال $]-\pi; \pi]$. • الوحدة التي نستعملها لقياس الزوايا هي الراديان. ونلفت انتباه التلاميذ إلى قبول التعبير المجازي الذي نعبر به على الزاوية وقيسها في نفس الوقت كقولنا " الزاوية ... تساوي $\frac{\pi}{3}$".	لشعاعين. (27)	
(28) • توظيف العلاقات المدروسة في السنة الأولى الخاصة بالعدد x والأعداد الحقيقية المرفقة له وهي: $-x$؛ $\pi + x$؛ $\pi - x$؛ ثم نمدها إلى الأعداد: $x - \frac{\pi}{2}$ و $x + \frac{\pi}{2}$.	حساب المثلثات: توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في حل مسائل مثلثية. (28)	
	توظيف دساتير التحويل المتعلقة بجيب التمام وبالجيب في حل مسائل مثلثية. (تابع)	
(29) • نتحقق عند استعمال الدائرة المثلثية من تحكّم التلميذ في تحديد أرباعها وصور القيم $\frac{\pi}{4}$، $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{\pi}{6}$؛ ومن تمثيل الأعداد $\frac{1}{2}$، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2}$؛ ثم ربط ذلك بالجيب وجيب التمام. كما نوجه التلميذ، كلما كان ذلك ممكناً لاستخدام التناظرات التي توفرها الدائرة المثلثية في حساب جيب وجيب تمام الزوايا الشهيرة في بقية الأرباع.	معادلات ومتراجحات مثلثية: حل المعادلات المثلثية الأساسية. (29)	
(30) • نقصر هنا على المتراجحات من النوع: $\sin x < a$، $\cos x < a$... فيما يخص المتراجحات، نكتفي بحلها على مجال طوله 2π على	حلّ متراجحات مثلثية بسيطة. (30)	

التحويلات النقطية	حل مسائل هندسية باستعمال التحويلات النقطية.	توظيف التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران في حل مسائل هندسية (31)	الأكثر وتمثل مجموعة الحلول على الدائرة المثلثية. (31) • لا تخصص دروس للتحويلات النقطية التي درست سابقاً (التناظر المركزي، التناظر المحوري، الانسحاب، الدوران)، بل تتم معالجتها من خلال بعض المسائل بتوظيف الخواص التالية: * الحفاظ على الاستقامية، المرجح، الزوايا الموجهة، الأطوال، المساحات. * الخواص المتعلقة بصور بعض الأشكال الهندسية (المستقيم، قطعة مستقيم، دائرة). • نقترح أنشطة حول إنشاء صور أشكال هندسية بتركيب تحاكيبين لهما نفس المركز. تجدر الملاحظة إلى أن كل تحاك نسبه سالبه هو مركب تحاك نسبه موجبه وتناظر مركزي.
		التحاكي: تعريف وخواص.	
		استعمال خواص التحاكي لإثبات استقامية نقط.	
		تعيين محل هندسي. (32)	(32) • نُذكر بأنّ البحث عن محل هندسي يجبرنا في أغلب الأحيان إلى إثبات الاحتواء في المرحلة الأولى ثمّ إثبات الاحتواء العكسي في المرحلة الثانية، بينما يمكننا استعمال تحويل نقطي من تجاوز ذلك بالوصول إلى استنتاجات مباشرة. • نقترح مسائل يبرز فيها التفكير المنطقي في اختيار وإيجاد عدّة طرق للحل (هندسة شعاعية، هندسة تحليلية، توظيف التحويلات النقطية، ...). عند البحث في هذه المسائل نستعمل ونثمن مراحل التجريب والتخمين التي يقوم بها التلميذ، بل ونشجعه على ذلك. كما يمكن الاستعانة ببرمجيات الهندسة الديناميكية. • في أغلب الحالات يكون من الأنجع استعمال دساتير تربط النسب المثلثية للزوايا والأضلاع ومساحة المثلث.
		حل مسائل حول الإنشاءات الهندسية.	

الجداء السلمي في المستوى	حل مسائل هندسية باستعمال الجداء السلمي	الجداء السلمي وخواصه: تعريفه، التعامد والجداء السلمي، حساب الجداء السلمي. (33)	(33) • تقدّم التعاريف المختلفة للجداء السلمي ويبرهن على تكافؤها. • تبرز المساويات: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 = AB^2 = \ \overrightarrow{AB}\ ^2$ الترميز "$\overrightarrow{AB}^2$" يُقرأ: "المربع السلمي للشعاع $\overrightarrow{AB}$".
		تطبيقات الجداء السلمي: - كتابة معادلة مستقيم عُم شعاع ناظمي له ونقطة منه باستعمال الجداء السلمي. - استعمال خواص الجداء السلمي لتعيين معادلة دائرة.	
		استعمال خواص الجداء السلمي و/أو عبارته التحليلية لحساب مسافات وأقياس زوايا.	
		إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا. (34)	(34) • تُدرج العلاقات المترية المألوفة (مبرهنة الكاشي، $MA^2 + MB^2$ ، $MA^2 - MB^2$) التي نستعملها لحساب المسافات والزوايا أو في البحث عن مجموعات نقط.
		إدراج العلاقات المترية المألوفة لحساب المسافات أو الزوايا وللبحث عن مجموعات نقط. (تابع)	
		توظيف الجداء السلمي لإثبات دساتير الجمع المتعلقة بجيب التمام وجيب وعبارتي $\sin 2a$ و $\cos 2a$ التي تستنتج منها.	
		حل المعادلة $a \cos x + b \sin x = c$.	
المتتاليات	1. التعرف على طبيعة متتالية عددية ودراسة اتجاه تغيرها. 2. حلّ مسائل باستعمال المتتاليات.	التقويم ومعالجة توليد متتالية عددية: وصف ظاهرة بواسطة متتالية. (35)	(35) • تُدرج الترميز بالدليل u_n ونُسجل أنّ الإشارة إلى الترميز الدالي $u(n)$ (المستخدم في الحاسبات البيانية) وتوظيفه بعض الأحيان يساعد التلميذ على استخدام هذه الحاسبات، حيث تظهر عندئذٍ المتتالية كدالة من $\square$ نحو $\square$ ونوضح الفرق بين المتتالية u والحد u_n الذي دليله n.

• نقترح أنشطة حول ظواهر متقطعة يُؤدي إلى علاقات من النوع $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$. • نحسب حدود متتالية بواسطة جدول أو حاسبة بيانية. • نقترح توضيحات بيانية مختلفة، بواسطة النقط $M_n(n; u_n)$ أو بواسطة النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ في حالة متتالية تراجعية، باليد أو بالحاسبة البيانية أو باستعمال البرمجيات. • نُدرج أمثلة لمتتالية غير رتيبة.			
(36) • نعتمد في دراسة اتجاه تغير متتالية على: - إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$. - أو اتجاه تغير الدالة f حيث $u_n = f(n)$. - أو على المقارنة بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1 (في حالة ما إذا كانت المتتالية ذات إشارة ثابتة).	اتجاه تغير متتالية: التعرّف على اتجاه تغير متتالية (u_n) ابتداءً من رتبة معينة. (36)		
(37) • نعرّف متتالية حسابية (أو هندسية) بواسطة حدّها الأول وعدد حقيقي r (أو q) يسمى أساس المتتالية.	المتتاليات الحسابية: التعرّف على متتالية حسابية. (37)		
	حساب الحد العام لمتتالية حسابية بدلالة n.		
	حساب مجموع p حداً متعاقباً من متتالية حسابية.		
	المتتاليات الهندسية: التعرّف على متتالية هندسية.		
	حساب الحد العام لمتتالية هندسية بدلالة n.		
	حساب مجموع p حداً متعاقباً من متتالية هندسية.		
(38) • تخمين نهاية متتالية عددية حدّها العام يؤول إلى ما لانهاية. يمكن أن نختار كمثل على ذلك نهاية متتالية	نهاية متتالية: - حساب نهاية متتالية عددية. -		

		المتتاليات المتقاربة. (38)	هندسية أساسها أكبر من 1. • نختار أمثلة بسيطة يقود حساب الحدود المتتابعة لها إلى هذا التخمين. • نستعمل التعريف التالي: نقول عن متتالية أنها متقاربة نحو l إذا وفقط إذا كان كل مجال مفتوح يشمل l يشمل أيضاً كل حدود المتتالية ابتداءً من رتبة معينة. • نضع حيز التطبيق هذا التعريف في الحالات البسيطة ونعطي على الأقل مثلاً على عدم تقارب متتالية. نطبق على المتتاليات النهايات المشابهة المتعلقة بنهايات الدوال.
		حساب نهاية متتالية باستعمال نظريات الحد الأعلى، الحد الأدنى والحصص في حساب النهاية.	
الهندسة في الفضاء	1. تنمية تصور الأشكال في الفضاء. 2. استعمال المنظور المتساوي القياس لتمثيل الأشكال في الفضاء. 3. التعرف على الأوضاع النسبية لمستقيمات ومستويات في الفضاء. 4. ممارسة الحساب الشعاعي في الهندسة التحليلية في الفضاء.	المقاطع المستوية: - إنشاء مقطع مكعب بمستوى. - إنشاء مقطع رباعي وجوه بمستوى. (39)	(39) • نستعمل بديهيات الوقوع والترتيب المدروسة في السنة الأولى ثانوي لتبرير هذه الإنشاءات.
		الحساب الشعاعي في الفضاء: ممارسة الحساب الشعاعي في الفضاء. (40)	(40) • تُمدد العمليات المألوفة على الأشعة في المستوى إلى الفضاء، بتوظيف خواص الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقيقي ونتجنب كل دراسة نظرية لبنية الفضاء الشعاعي.
		استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.	

	البرهان على أنَّ أشعة من نفس المستوي.		
(41) • تهدف هذه الفقرة إلى تمكين التلاميذ من التعليم في الفضاء.	التعليم في الفضاء: تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها. (41)		
(42) • يُحبذ البدء في معالجة حالات خاصة يكون فيها المستوي موازيا لأحد مستويات الإحداثيات ثم التوسع بعد ذلك. • نستعمل الترميز $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ مثلا للدلالة على مستوي الإحداثيات المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ونعيّن معادلته، مما يساعد على استخراج معادلات المستويات المطلوبة.	تعيين معادلة لمستوي موازٍ لأحد مستويات الإحداثيات. (42)		
	تعيين معادلات مستقيم معرّف بنقطة وشعاع توجيه له.		
	إثبات أنَّ أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.		
(43) • تستعمل مبرهنة فيثاغورث لإيجاد هذا الدستور، ثم يُوظف في التطبيقات للحصول على معادلات كل من: * الكرة التي مركزها مبدأ المعلم. * الأسطوانة الدوارنية التي محورها أحد محاور الإحداثيات. * المخروط الدوراني الذي رأسه مبدأ المعلم ومحوره أحد محاور الإحداثيات. في حالة الأسطوانة، يمكن اعتبار أولاً مقطع الكرة التي مركزها O ونصف قطرها r بأحد مستويات الإحداثيات، مثلاً مقطع الكرة بالمستوي الذي معادلته $z = 0$ هو دائرة مركزها O ومعادلتها في المستوي $P(O; \vec{i}, \vec{j})$ هي $x^2 + y^2 = r^2$ وثمّ نتساءل عن معنى هذه المعادلة عندما	المسافة بين نقطتين: استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين. (43)		

		يتغير Z.	
		استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة: سطح كرة، الاسطوانة الدورانية، المخروط الدوراني.	
	التقويم ومعالجة		

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثانية ثانوي	الشعبة: رياضيات
الفصل الأول: 12 أسبوعا	الدوال	3 أسابيع 21 ساعة
	الاشتقاقية	أسبوعان ونصف 18 ساعة
	الاحتمالات	3 أسابيع 21 ساعة
	المرجح	أسبوع ونصف 10 ساعات
	تقويم ومعالجة	أسبوعان 14 ساعة
	المجموع	12 أسبوعا 84 ساعة
الفصل الثاني: 10 أسابيع	النهايات	أسبوعان ونصف 17 ساعة
	الزوايا الموجهة	أسبوع ونصف 11 ساعة
	التحويلات النقطية	أسبوع ونصف 10 ساعات
	الجداء السلمي	أسبوعان ونصف 18 ساعة
	التقويم والمعالجة	أسبوعان 14 ساعة
	المجموع	10 أسابيع 70 ساعة
الفصل الثالث: 6 أسابيع	المتتاليات	أسبوعان 2 14 ساعة
	الهندسة في الفضاء	أسبوعان 2 14 ساعة
	التقويم ومعالجة	أسبوعان 2 14 ساعة
	المجموع	6 أسابيع 42 ساعة

موقع عيون البصائر التعليمي